

BOLETIM DO MUSEU DE BIOLOGIA

« PROF. MELLO LEITÃO »

SANTA TERESA - ESPÍRITO SANTO - BRASIL

BIOLOGIA - Nº. 12 - 28 de Setembro de 1953

TROCHILIDEOS DO BRASIL

2ª. Edição, de 14-4-1961
atualizada

Augusto Ruschi
Museu Nacional

Depois de alguns anos percorrendo todos os Estados e Territórios do Brasil, estudando e colecionando material vivo e taxidermisado, exclusivamente dessa rica família de aves, para um trabalho monográfico sobre a trochilifauna brasileira, podemos agora apresentar uma lista completa e atualizada das espécies que ocorrem em seu território, com a sua distribuição geográfica. Entretanto, ainda algumas espécies e sub-espécies novas serão encontradas, especialmente nas regiões serranas, limitrofes com os demais países. A necessidade de um colecionamento metódico para esse grupo é um dos fatores mais importantes; daí a razão para tantas surpresas ainda. O material da trochilifauna brasileira é bastante escasso, mesmo nos grandes Museus que visitamos. A enumeração das espécies aqui citadas, será a usada no trabalho monográfico em preparo.

1 - *Rhamphodon naevius* (Dumont)

Distribuição: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na Serra do Mar e Mantiqueira.

2 - *Glaucis hirsuta hirsuta* (Gmelin)

Distribuição: Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Brasília, Territórios do Acre, Rio Branco, Amapá e Guaporé.

3 - *Glaucis hirsuta affinis* Lawrence

Distribuição: Amazonas, Rio Madeira e Rio Preto.

4 - *Glaucis dohrni* (Bourcier & Mulsant)

Distribuição: Leste do Brasil: Bahia, região do Mucuri; Minas Gerais: Nanaque; Espírito Santo: do Rio Itaúnas para o Norte, até a divisa com a Bahia e Minas e em Baixo Guandú, sempre em matas virgens, altas, que margeiam os córregos.

5 - *Threnetes leucurus leucurus* (Linnaeus)

Distribuição: Amazonas: Teffé e Rio Madeira.

6 - *Threnetes leucurus medianus* Hellmayr

Distribuição: Pará: Utinga, Prata, Belem; Território do Amapá.
Maranhão: Tury-assú.

7 - *Threnetes leucurus cervinicauda* Gould

Distribuição: Rio Solimões: Benjamin Constant, Tabatinga. R.
Javari: Atalea do Norte.

8 - *Phaethornis superciliosus superciliosus* (Linnaeus)

Distribuição: Amazonas: Rio Negro, Cucuy; S. Gabriel; Campos Salles; Manaus; Rio Jamundá, Faro, no Par

9 - *Phaethornis malaris muelleri* Hellmayr

Distribuição: Pará: Utinga, Prata e Rio Tapejóz em Aramana

10 - *Phaethornis malaris insolitus* Zimmer

Distribuição: Amazonas, Rio Uaupés, Tahuapunto e Tabocal.

11 - *Phaethornis malaris moorei* Lawrence

Distribuição: Amazonas, Rio Tocantins. Território do Amapá

12 - *Phaethornis malaris ochraceiventris* Hellmayr

Distribuição: Rio Amazonas, Teffé; Rio Madeira, Humaytá, Clamá.

13 - *Phaethornis malaris insignis* Todd

Distribuição: Pará, Rio Tapajóz, Igarapé Amorim. Amazonas:
Rio Madeira, Borba.

14 - *Phaethornis hispidus hispidus* (Gould)

Distribuição: Amazonas, Rio Madeira; Rio Javari em Benjamin
Constant; Mato Grosso: Tapirapoan, Cáceres
Diamantino. Território Guaporé: Rio Guaporé.

15 - *Phaethornis eurynome* (Lesson)

Distribuição: Estados litoraneos desde o Espírito Santo até
Rio Grande do Sul.

16 - *Phaethornis bourcierii whitelyi* Boucard

Distribuição: Território do Rio Branco, Monte Roraima.

17 - *Phaethornis bourcierii bourcierii* (Lesson)

Distribuição: Amazonas, Alto Rio Negro, Tatú, Rio Solimões,
Manacapurú e Rio Jamauchim, Tucunaré.

18 - Phaethornis philippi philippi (Bourcier)

Distribuição: Amazonas: Rio Purús, Rio Juruá e Rio Madeira.

19 - Phaethornis squalidus squalidus (Temminck)

Distribuição: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, nas Serras do Mar e Mantiqueira.

20 - Phaethornis squalidus amazonicus Hellmayr

Distribuição: Pará, Obidos e Rio Tapajóz, Rio Amazonas, Monte Alverne.

21 - Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre)

Distribuição: Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão e Brasília.

22 - Phaethornis nattereri Berlepsch

Distribuição: Mato Grosso: Cáceres: Tapirapoan, Chapada, Diamantino; Território Guaporé, Rio Guaporé, Maranhão: Barra do Corda; Piauí: Barra do Cocal.

23 - Phaethornis gounellei Boucard

Distribuição: Piauí, Ceará, Mato Grosso e Bahia. Lugar mais comumente encontrado é na Serra do Sincorá na Bahia.

24 - Phaethornis rupurumii rupurumii Boucard

Distribuição: Território do Rio Branco, Serra da Lua no Roraima.

25 - Phaethornis rupurumii amazonicus Hellmayr

Distribuição: Pará: Rio Tapajoz, Santarém e Monte Alegre.

26 - Phaethornis ruber ruber (Linnaeus)

Distribuição: Amazonas; Pará: Belem; Territórios do Acre, Amapá e Guaporé; Goiás, Mato Grosso, Piauí, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Maranhão e Brasília.

27 - Phaethornis ruber episcopus Gould

Distribuição: Amazonas, Manaus, Territórios do Rio Branco, região do Roraima.

28 - Phaethornis ruber nigricinctus Lawrence

Distribuição: Amazonas, Alto Rio Negro, Cucuhy, Rio Solimões, Benjamin Constant.

29 - *Phaethornis griseogulares griseocularis* Gould

Distribuirão: Territórios do Rio Branco, Serra do Curupira no Roraima.

30 - *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer

Distribuição: Pará, Rio Tapajóz, margem direita.

31 - *Phaethornis longuemareus idallae* (Bourcier & Mulsant)

Distribuição: Espírito Santo, Santa Teresa, Santa Leopoldina, Cariacica, Vitória, Serra, Guarapari, Anchieta, Linhares, São Mateus, Conceição da Barra, Baixo Guandú; Bahia, Mucurici; Minas Gerais, Nanuque; Rio de Janeiro, Nova Friburgo.

32 - *Campylopterus largipennis largipennis* (Boddaert)

Distribuição: Amazonas, Rio Negro; Rio Urupês, Manaus, Campos Salles.

33 - *Campylopterus largipennis obscurus* Gould

Distribuição: Amazonas, Rio Madeira, Calamá, Aliança e Porto Velho; Pará: Utinga, Prata; Rio Tocantins, Mocajuba; Rio Tapajóz, Tauary; Marajó. Maranhão. E Santa Isabel, no Rio Preto, no E. do Amazonas.

34 - *Campylopterus largipennis aequatorialis*

Distribuição: Amazonas: Rio Madeira, Marmelos; Mato Grosso, Tapirapoa, Diamantino, Barão de Melgaço, Rio Jamary e Sete de Setembro.

35 - *Eupetomena macroura macroura* (Gmelin)

Distribuição: Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Brasília.

36 - *Eupetomena macroura simoni* Hellmayr

Distribuição: Bahia, Minas Gerais, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Piauí, Ceará e Maranhão.

37 - *Florisuga mellivora mellivora* (Linnaeus)

Distribuição: Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão e Território do Amapá.

38 - *Melanotrochilus fuscus* (Vieillot)

Distribuição: Estados litoraneos, desde Pernambuco até Rio Grande do Sul; e Minas Gerais.

39 - *Colibri delphinae* (Lesson)

Distribuição: Território do Rio Branco, região do Roraima.

40 - Colibri serrirostris (Vieillot)

Distribuição: Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Goiaz, Mato Grosso e Brasília.

41 - Anthracothorax viridigula (Boddaert)

Distribuição: Amazonas, Pará, Maranhão, Território do Amapá e Ilha de Marajó.

42 - Anthracothorax nigricollis nigricollis (Vieillot)

Distribuição: Todos os Estados e Territórios do Brasil.

43 - Avocettula recurvirostris (Swainson)

Distribuição: Pará: Monte Alegre e Santarém; Maranhão: Tury-assú.

44 - Chrysolampis moschitus (Linnaeus)

Distribuição: Maranhão, Pará, Piauí, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiaz e Brasília.

45 - Klais guimeti guimeti (Bourcier & Mulsant)

Distribuição: Alto Amazonas, no Rio Javari.

46 - Stephanoxis lalandi lalandi (Vieillot)

Distribuição: Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, nas Serras do Mar e Mantiqueira.

47 - Stephanoxis lalandi loddigesi (Gould)

Distribuição: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

48 - Lophornis ornata (Boddaert)

Distribuição: Territórios do Rio Branco e Amapá.

49 - Lophornis gouldii (Lesson)

Distribuição: Pará, Maranhão, Mato Grosso, Norte de Goiaz e Pernambuco.

50 - Lophornis magnificus (Vieillot)

Distribuição: Centro e Leste do Brasil: Mato Grosso, Goiaz, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Brasília.

51 - Lophornis chalybeus chalybeus (Temminck)

Distribuição: Estados litoraneos, desde Espírito Santo até San-

ta Catarine; e Minas Gerais, nas Serras do Mar e Mantiqueira, sendo mais comum em Joinville, em Santa Catarina.

52 - *Lophornis chalybeus verreauxii* (Bourcier & Verreaux)

Distribuição: Mato Grosso desde Tapirapoau, Diamantino para o Noroeste. Guaporé. Pará, Cachimbo e Cururu. Amazonas no Alto Solimões, em Benjamin Constant, Tabatinga e Atalea do Norte, no Rio Javari.

53 - *Lophornis pavonina pavonina* (Salvin & Godman)

Distribuição: Região do Monte Roraima, limites da Venezuela e Guiana Inglesa.

54 - *Popelairia langsdorffi langsdorffi* (Temminck)

Distribuição: Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nas Serras do Mar e Mantiqueira.

55 - *Popelairia langsdorffi melanosternon* (Gould)

Distribuição: Alto Amazonas, São Paulo de Olivença, Benjamin Constant, Tabatinga, Atalea do Norte, Rio Madeira, Território do Guaporé, Rio Guaporé.

56 - *Discosura longicauda* (Gmelin)

Distribuição: Pará, Pernambuco, Território do Rio Branco, Bahia, Minas e Espírito Santo.

57 - *Chlorestes notatus notatus* (Reichenbach)

Distribuição: Amazonas, Alto Rio Negro, Rio Solimões, Benjamin Constant, Rio Javari, Atalea do Norte, Território do Rio Branco, Pará, Utinga e Prata, Maranhão, Miritiba, Pernambuco, Palmares, Paraíba, Bahia, Espírito Santo, Norte de Goiás e Minas Gerais, Território do Amapá, Rio Cajari.

58 - *Chlorestes notatus puruensis* (Riley)

Distribuição: Rio Tocantins, Mocajuba e Baião; Rio Xingú, Tapará e Porto de Moz; Rio Tapajoz, Tauari. Piquiatuba, Caxiricatuba, Igarapé Brabo, Igarapé Amorim e Santarem. Amazonas, Rio Madeira, Borba, Igarapé Auará, Humayta, Marmellos e Rosarinho. Rio Preto, Santa Isabel, Teffé. Rio Purus e Negro, Muirapinima e Igarapé Cacao Pereira.

51 - *Chlorestes hypocyaneus* (Gould)

Distribuição. É duvidosa se da Bahia ou Rio de Janeiro. O certo é tratar-se de um híbrido. Pois só é conhecido do exemplar tipo.

60 - *Chlorestes subcaeruleus* (Elliot)

Distribuição: Bahia. É também um possível híbrido, pois só é conhecido pelo exemplar tipo.

61 - *Chlorestes malvina* Reichenbach

Distribuição: Rio de Janeiro. É um híbrido provável entre *Leucochloris albicollis* e *Chlorostilbon aureoventris pucherani*, só conhecido do exemplar tipo.

62 - *Chlorostilbon mellisugus phoeopygus* (Tschudi)

Distribuição: Mato Grosso, Tapirapoan, Diamantino; Território do Guaporé; Amazonas, Rio Solimões, Benjamin Constant, Tabatinga; Rio Javari, Rio Madeira.

63 - *Chlorostilbon mellisugus subfurcatus* Berlepsch

Distribuição: Território do Rio Branco e Amapá.

64 - *Chlorostilbon aureoventris pucherani* (Bourcier & Mulsant)

Distribuição: Piauí, Ceará, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Goiaz, Maranhão e Alagoas.

65 - *Chlorostilbon aureo-ventris aureo-ventris* (d'Orbigny & Lafresnaye)

Distribuição: Mato Grosso, Caceres, Tapirapoan, Chapada, Urucum, Cachimbo no Pará, Goiaz, Brasília.

66 - *Chlorostilbon aureo-ventris berlepschi* Pinto

Distribuição: Rio Grande do Sul, Uruguayana.

67 - *Crinis chlorolaemus* (Elliot)

Distribuição: Bahia. Provavel híbrido entre *Anthracothonax n. nigricollis* e *Chrysolampis moschitus*; é conhecido apenas por alguns exemplares.

58 - *Smaragdochrysis Iridescens* (Gould)

Distribuição: Rio de Janeiro. É também um híbrido, provavelmente, entre *Calliphlox amethystina* e *Chlorostilbon aureo-ventris pucherani*; só conhecido do exemplar tipo.

69 - *Pticoptera lolaema* (Reichenbach)

Distribuição: São Paulo. Ipaema. Provavelmente é também um híbrido entre *Aphantochroa cirrochloris* e *Thaluranina glaucopis*.

70 - *Thaluranina furcata furcata* (Gmelin)

Distribuição: Amazonas, Rio Jamundá, Faro; Manaus, Itacotiara e o delta do Amazonas, Ilha Mexiana.

71 - *Thaluranía furcata furcatoides* (Gould)

Distribuição: Leste do Pará, a partir do Rio Tocantins; Utinga, Mocajuba; Maranhão, Miritiba, Tury-assú e São Luiz.

72 - *Thaluranía furcata nigrofasciata* (Gould)

Distribuição: Alto Amazonas: Rio Uaupés, Tahuapunto e Iauarete; Rio Negro, Tatú, Yavanarí, Tabocal, Cucuhy, Yucabí, S. Maria, Manaus e Muirapinima.

73 - *Thaluranía furcata simoni* Hellmayr

Distribuição: Amazonas, Teffé; Rio Solimões, Manacapurú, Benjamin Constant; Rio Javari, Atalea do Norte.

74 - *Thaluranía furcata fissilis* Berlepsch & Hartert

Distribuição: Território do Rio Branco, região do Roraima, limites da Venezuela e Guiana Inglesa.

75 - *Thaluranía furcata balzani* Simon

Distribuição: Amazonas, Rio Madeira, Rio Machado. Pará, Rio Tapajóz, Rio Iriri, Vila Braga, Rio Jamauchim; Borba, Vila Bela Imperatriz, Santarem, Porto Velho, Calamá, Aliança, Carixicatuba e Aramanay.

76 - *Thaluranía furcata baeri* Hellmayr

Distribuição: Maranhão Sul, Goiaz, Goiania, Ceres, Planaltina, Anapolis; M. Grosso, Caceres, Tapirapoan, Cuiabá, Alto Xingú, Piauí, Patos, Ceará, M. Gerais, Brasília.

77 - *Thaluranía furcata eriphile* (Lesson)

Distribuição: Minas Gerais; Mariana, Matosinhos, Belo Horizonte, S. Leopoldo; Lagôa Santa, Tres Marias, Diamantina.

78 - *Thaluranía watorteni* (Bourcier)

Distribuição: Zona costeira do Pará, foz do Amazonas, de Pernambuco até Bahia.

79 - *Thaluranía glaucopsis* (Gmelin)

Distribuição: Todos os Estados da faixa litoranea, da Bahia até o Rio Grande do Sul; Minas Gerais e Mato Grosso, em Aquidauna.

80 - *Eucephala caeruleo lavata* Gould

Distribuição: São Paulo. Provavelmente trata-se de um híbrido.

81 - *Eucephala chlorocephala* (Bourcier)

Distribuição: Rio de Janeiro. Provavelmente trata-se de um híbrido.

82 - Eucephala smaragdo caerulea Gould

Distribuição: Bahia. Provavel hibrido entre *Chlorestes notatus* notatus e *Thalurania glaucopia*. É conhecido unicamente do exemplar tipo.

83 - Augasma smaragdinea Gould

Distribuição: Rio de Janeiro. Provavelmente trata-se de um hibrido.

84 - Hylocharis sapphirina (Gmelin)

Distribuição: Amazonas, Pará, Territórios do Rio Branco, Amapá, Guaporé; Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Goiaz e Alagoas.

85 - Hylocharis cyanus cyanus (Vieillot)

Distribuição: Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

86 - Hylocharis cyanus viridiventris Berlepsch

Distribuição: Pará, Rio Gurupí; Território do Rio Branco, região do Roraima; Território do Amapá. Rio Cajari; Amazonas, Rio Madeira. Pernambuco e Maranhão.

87 - Hylocharis cyanus rostrata Bourcier

Distribuição: Rio Solimões, Benjamin Constant e Tabatinga; Rio Javari, Atalea do Norte.

88 - Hylocharis cyanus conversa Zimmer

Distribuição: Mato Grosso, Tapirapoan, Caceres, Alto Xingú e Brasília.

89 - Hylocharis pyropygia (Salvin & Godman)

Distribuição: Bahia. Provavelmente um hibrido.

90 - Hylocharis chrysur chrysur (Shaw)

Distribuição: Mato Grosso, São Paulo, Goiaz, Minas Gerais, S. Catarina, Rio Grande do Sul e Brasília.

91 - Hylocharis chrysur lessoni Pinto

Distribuição: Rio Paraná, Porto Camargo e Rio Paracai.

92 - Hylocharis chrysur maxwelli Hartert

Distribuição: Caceres e região do Pantanal de Mato Grosso, em divisa com a Bolívia.

93 - Chrysuronia oenone josephinae (Bourcier & Mulsant)

Distribuição: Amazonas, no Alto Solimões, Benjamin Constant

e Tabatinga Rio Javari, Atalea do Norte.

94 - *Leucochloris albicollis* (Viellot)

Distribuição: Estados Litoraneos, desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, e Minas Gerais, nas Serras do Mar e Mantiqueira.

95 - *Polytmus guainumbi thaumantias* (Linnaeus)

Distribuição: Pará, Território do Amapá, Marajó, M. Grosso, Goiaz, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Maranhão, Ceará, Alagoas, Sergipe e Brasília.

96 - *Polytmus theresiae theresiae* (Da Silva Maia)

Distribuição: Amazonas, Pará, Território do Amapá e Rio Branco.

97 - *Polytmus theresiae leucorrhous* (Sclater & Salvin)

Distribuição: Alto Rio Negro, Tatú, Cucuhy, Marabitanas.

98 - *Talaphorus chlorocercus* (Gould)

Distribuição: Alto Amazonas.

99 - *Amazilia chionogaster hypoleuca* (Gould)

Distribuição: Mato Grosso, Cáceres.

100 - *Amazilia fimbriata fimbriata* (Gmelin)

Distribuição: Pará, Rio Tocantins, Arumatheua; Rio Tapajoz, Boim, Pinhel, Marajó, Monte Alegre, Maracá, Carvoeira, Frechal, Rio Surumú.

101 - *Amazilia fimbriata laeta* (Hartert)

Distribuição: Amazonas. Teffé, Benjamim Constant.

102 - *Amazilia fimbriata alia* Zimmer

Distribuição: Amazonas, Rio Madeira, Rosarinho e Borba. Rio Negro, Manaus, Cacao Pereira e Campos Salles. Rio Jamundá. Pará, Rio Tapajóz, Rio Xingú, Porto de Moz e Tapará.

103 - *Amazilia fimbriata nigricauda* (Elliot)

Distribuição: Mato Grosso, Tapirapoan e Utiarity; Maranhão, S. Luiz, Santa Filomena, Rosario, Barão de Grajaú, S. João dos Patos; Pernambuco, Garanhuns; Ceará, Viçosa; Piauí, Frecheiras, Urussuí, Correntes. Bahia, Orobó, Santa Rita, Morro do Chapéu Tamburi, Goiaz, Rio Tezouras e Leopoldina; Brasília, Espírito Santo, Conceição da Barra, Linhares e São Mateus; Minas Gerais, Nanuque, Tres Marias, Diamantina.

104 - *Amazilia fimbriata tephrocephala* (Viellot)

Distribuição: Estados litoraneos, desde o Espírito Santo até Santa Catarina, na orla marítima, restingas.

105 - *Amazilia versicolor milleri* (Bourcier)

Distribuição: Amazonas, Rio Negro, Rio Jamundá e Mato Grosso.

106 - *Amazilia versicolor nitidifrons* (Gould)

Distribuição: Baixo Tocantins, Cametá e S. Antonio do Prata no Pará; Maranhão, Piauí, Ceará e Norte de Goiaz.

107 - *Amazilia versicolor brevisrostris* (Lesson)

Distribuição: Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

108 - *Amazilia versicolor versicolor* (Vieillot)

Distribuição: Sul da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro Minas Gerais, São Paulo, Sudoeste de Goiaz, Sul de Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul.

109 - *Amazilia versicolor kubitcheki* Ruschi

Distribuição: Sudeste de Goiaz, Brasília e Noroeste de Minas Gerais.

110 - *Amazilia lactea bartletti* (Gould)

Distribuição: Alto Amazonas, Rio Negro.

111 - *Amazilia lactea lactea* (Lesson)

Distribuição: Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.

112 - *Amazilia leucogaster leucogaster* (Gmelin)

Distribuição: Território do Rio Branco, Maranhão e Piauí.

113 - *Amazilia leucogaster bahiae* (Hartert)

Distribuição: Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, e Maranhão.

114 - *Amazilia viridigaster cupreicauda* Salvin & Godman

Distribuição: Território do Rio Branco, região do Roraima, zona limitrofe da Venezuela e Guiana Inglesa.

115 - *Aphantochroa cirrochloris* (Vieillot)

Distribuição: Mato Grosso, Goiaz, Minas Gerais, Brasília, e Estados litoraneos, desde Pernambuco até Rio Grande do Sul.

116 - *Clytolaema rubricauda* (Boddaert)

Distribuição: Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

117 - *Polyplancta aurescens* (Gould)

Distribuição: Alto Amazonas, Rio Javari, Rio Juruá, Território do Acre; Pará, Mato Grosso; Rio Teles Pires.

118 - *Heliodoxa schreibersii schreibersii* (Bourcier)

Distribuição: Alto Rio Negro.

119 - *Heliodoxa gularis* (Gould)

Distribuição: Alto Amazonas, Rio Solimões, Benjamin Constant, Rio Javari, Atalea do Norte.

120 - *Topaza pella pella* (Linnaeus)

Distribuição: Amazonas, Pará, Território do Amapá e Rio Branco.

121 - *Topaza pella pyra* (Gould)

Distribuição: Amazonas e Alto Rio Negro.

122 - *Augastes scutatus* (Temminck)

Distribuição: Minas Gerais, Serras do Caraça, Cipó, Itacolomí e Ouro Preto.

123 - *Augastes lumachellus* (Lesson)

Distribuição: Bahia, Chapada Diamantina, no lugar Morro do Chapéu, que sugiro como pátria. O local Cachoeira do Ferro Doido, Canabravinha, Olho Dagua, e os montes denominados: Morro do Chapéu, Feliz e do Facão. Toda região está compreendida entre 1.000 e 1.300 metros de altitude. Esta espécie é endêmica, como as demais do Genero *Augastes*, entre as quais colocamos a espécie até então no Genero *Schistes*, com suas sub-espécies: *geoffroyi geoffroyi* (Bourcier); *geoffroyi albogularis* Gould; *geoffroyi chapmani* Berlioz. Os fundamentos para este ato, são os de ordem morfológica e biológica descritos no trabalho que será apresentado no Congresso Internacional Ornitológico que será realizado em 1962 nos U. S. A. em Ithaca, Cornell University.

124 - *Heliothryx aurita aurita* (Gmelin)

Distribuição: Território do Rio Branco, Amazonas, Rios Amazonas, Negro e Branco; Pará, Murucutú e Fátima no Rio Jamundá.

125 - *Heliothyx aurita auriculata* (Nordman)

Distribuição: Amazonas, Rio Madeira; Mato Grosso, Rio Roosevelt; Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, São Paulo, Paraná e Alagoas.

126 - *Heliothyx aurita phainolaema* Gould

Distribuição: Pará, Santo Antônio do Prata, Rios Tocantins, Purús, e Jemauchim; Maranhão, Tury-assú.

127 - *Heliomaster longirostris longirostris* (Audebert & Vieillot)

Distribuição: Amazonas, Benjamin Constant, Tabatinga; Rio Javari, Atalea do Norte; Pará, Santarem, Território do Amapá, Rio Cajarí; Mato Grosso, Tapirapoa, Cáceres; Goiás, Brasília; Maranhão e Ceará.

128 - *Heliomaster furcifer* (Shaw)

Distribuição: Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Goiás, Pará, Amazonas, Rios Solimões e Javari.

129 - *Heliomaster squamosus* (Temminck)

Distribuição: Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

130 - *Heliactin cornuta* (Wied)

Distribuição: Mato Grosso, Goiás, Bahia, Pernambuco, Piauí, Minas Gerais, São Paulo, Maranhão, Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba, Sul do Pará e Brasília.

131 - *Calliphlox amethystina* (Boddaert)

Distribuição: Todos os Estados e Territórios do Brasil.