

# BOLETIM DO MUSEU DE BIOLOGIA

PROF. MELLO LEITÃO  
SANTA TERESA — E. E. SANTO — BRASIL

---

SÉRIE ZOOLOGIA — Nº 77 — 22/11/75

---

## AVES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Augusto Ruschi  
Museu Nacional

Algumas observações sobre: **NEOMORPHUS GEOFFROYI**  
**DULCIS** Snethlage, 1927

*Neomorphus ducis* Snethlage, 1927, Ornithol. Monatsber, XXXV, p. 80

NOME VULGAR LOCAL: JACU VERDE; JACU DE ESTALO; JACU MULAMBO.

NOME INGLÊS: GREEN GROUND-CUCKOO.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: Matas altas do Platô Terciário do E. Santo e Minas Gerais. Só na Reserva Biológica de SOORETAMA e no Parque Estadual do Rio Doce, no E. M. Gerais.

CARACTERÍSTICAS: Comprimento 506mm. Aza 167mm. Cauda

294mm. Bico 40mm. Peso 380grs. A fotografia da estampa em cores que ilustra o presente trabalho, foi feita pelo autor, em seu habitat natural, na RESERVA BIOLÓGICA DE SOORETAMA, é de um macho adulto. O macho e fêmea possuem a mesma coloração, porém na fêmea, as cores são menos acentuadas. Os lados da cabeça, incluindo bochechas e as regiões auriculares, cortados de faixas pretas, sobre fundo branco arruivado; pileo com dois terços anteriores revestidos de penas escuras orladas de largo debrum côr ferrugineo; penacho da nuca azul ferrete com reflexos violáceos e com a base dessas penas do penacho de côr marron claro. Dorso e coberteiras superiores das azas de coloração verde-bronzeado com reflexo azulado na parte dorsal superior; remiges primárias escuras, com barba externa lustrada de verde-bronze; parte dorsal inferior castanho mesclado esverdeado; supracaudais verde-bronzeadas; cauda verde-bronzeada com reflexo cobre. Parte ventral, mento, garganta e peito, pardo esbranquiçado, com as penas cortadas de faixas arciformes escuras, dando aspecto escamoso; abdome, cinza-pardacento; parte baixa dos flancos, calções e alto ventre castanho; baixo ventre

e crisso marron enegrescido forte; penas da porção mais baixa do peito, largamente debruadas de negro, formando uma faixa transversal no limite com o abdome; bico amarelado, com a base escurecida; pés cinzento-plumbeo. Iris castanho amarelado.

**OBSERVAÇÕES:** O Gênero *NEOMORPHUS* está representado no E. Santo pela subespécie acima descrita, e no momento só encontrada nas RESERVAS BIOLÓGICAS citadas, portanto, bastante ameaçada a sua extinção, uma vez que ainda é muito precária a fiscalização e o serviço de guarda e vigilância dessas áreas. Infelizmente muito pouco se conhece da vida e comportamento de todas as espécies do referido Gênero, que no Brasil estão representadas por quatro espécies. Durante os trabalhos de colecionamento e preparo de espécimens para as coleções ornitológicas do Museu Nacional e do Museu de Biologia Pro. Mello Leitão, tive oportunidade de observar alguns exemplares, nas áreas da RESERVA BIOLÓGICA DE SOORETAMA, FINHEIROS, COMBÓIOS, FLORESTA DA CIA. VALE DO RIO DOCE, e algumas áreas contíguas a essas RESERVAS, até os anos de 1974, e ultimamente, só nas referidas RESERVAS ainda existe; com excessão da RESERVA DE COMBÓIOS, que acreditamos não mais existir, face a depredação ali iniciada sem que o Governo do Estado do E. Santo, tome a providência mínima a seu favor.

O canto do Jacú de estalo, se limita a roucos grunhidos, baixos e fortes estalos que parecem com o matraquear de paletas de madeira, com certo descompasso. Observamos um casal quando buscava alimento na floresta de SOORETAMA. Nessa busca corriam celeremente pelo solo e quando o gafanhoto saía em vôo, era apanhado em tal rapidez que ao salto decisivo, buscando-o no ar, ainda fazia um revolveio no ar, para cair ao solo e logo iniciar com o bico o seu esfacelamento para alimentar-se. Também vimos com que habilidade buscavam no tronco das árvores da floresta, numa altura de um ou dois metros, pequenos cameliões do Gênero *Anolis*, e ao trazê-lo ainda se revolteando com o corpo e cauda, era subitamente amassado em toda sua extensão e engolido; quando o réptil era pouco maior, era então fragmentado e ingerido avidamente aos pedaços. É impressionante como percorrem também entre um cipóal na floresta virgem, quando estão em busca de algo que perceguem para seu alimento. Não tenho conhecimento que já fôra encontrado ninho dessa espécie, e é na RESERVA BIOLÓGICA DE SOORETAMA que ainda nos resta a possibilidade de observá-lo. O número de exemplares suponho seja muito pequeno atualmente.

## SUMMARY

In the present paper the author after turn on considerations about the bird species GREEN GROUND-CUCKOO, deplore the present condition why it is seriously threatnet of the extinction. Deforestation which over much of the country is almost absolute, is the principal reason for the decline of the Espirito Santo State fauna and flora. *NEOMORPHUS GEOFFROYI DULCIS* have been particulary severely affected.



el lago verde - *Neomorphus geoffroyi dulcis*

**BIBLIOGRAFIA**

- 1938 — PINTO, O.M. de O. — Cat. Av. do Brasil 1ª Parte. Dep. Zool. S. Paulo.
- 1954 — RUSCHI, A. — Algumas espécies Zoológicas e Botânicas em vias de extinção no E. E. Santo. Método empregado para a sua prospecção e para o estabelecimento de área mínima para a perpetuação da espécie em seu habitat natural.
- 1966 — SCHAUENSEE, R.M. de — The Species of Birds of South America with their distribution. The Ac. of Nat. Sci. of Philadelphia.
- 1967 — RUSCHI, A. — Lista das Aves do E. E. Santo, Bol. Mus. B.M.L. Zool. nº 28A.
- 1973 — NOGUEIRA, NETO P. — A criação de animais indígenas vertebrados. Ed. Tecnapis. S.P.