

# BOLETIM DO MUSEU DE BIOLOGIA

PROF. MELLO LEITÃO  
SANTA TERESA — E. E. SANTO — BRASIL

---

SÉRIE ZOOLOGIA — Nº 98 — 23/09/1980

---

## A FAUNA E A FLORA DA ESTAÇÃO BIOLÓGICA DE SOORETAMA

Augusto Ruschi  
Museu Nacional

### INTRODUÇÃO

Em prosseguimento aos trabalhos constantes do Convênio IBDF-MBML, desde 1972 até 1980, foi dado início e andamento ao Estudo da Flora e Fauna do Estado. Hoje damos a presente relação e listagem das espécies assinaladas na área dos 25.000 hectares que são abrangidos pela RESERVA BIOLÓGICA DE SOORETAMA.

### AGRADECIMENTOS

Para a apresentação desse trabalho, temos que nesta oportunidade expressar os nossos mais sinceros e profundos agradecimentos aos colaboradores que participaram dos trabalhos de campo, ou da identificação de material e ainda na datilografia e arranjo final. Assim, aos Profs. Drs. Peter Weygoldt, James Jackson, Paulo Arawaya, Eric La Gasa e Marilande Angeli.

### HISTÓRICO

A atual área da Reserva Biológica de Sooretama, era constituída de duas glebas de florestas. A primeira formada pela área constituída do Refúgio de animais silvestres, "Refúgio de Sooretama" criado pelo Decreto Estadual do E. S. n.º 14.977 de 21.9.1943., com a área de 14.000 hectares, e a área constituída pela Reserva Florestal ou Integral do "RIO BARRA SECA" com 10.000 hectares criada pelo Decreto n.º 55 de 20.9.1948. Ambas áreas foram unidas em 6.6.1969 pelo IBDF, já que lhe haviam sido transferidas, e constituíram a RESERVA BIOLÓGICA DE SOORETAMA, atual. Está situada no Município de Linhares, na Região ao Norte do Rio Doce, precisamente no Rio Barra Seca, em divisa com o Município de São Mateus, sendo atravessado pela Estrada BR 101, em toda sua extensão Norte-Sul, por mais de 10 kms. de estrada asfáltica.

### FATORES BIOFÍSICOS

**Drenagem** — O Rio principal nessa Reserva é o Barra Seca, pertence a Bacia do Leste e nasce próximo à divisa de Minas Gerais com o E. Santo, os seus afluentes principais, dentro da Reserva Biológica são o Cupido e o Quirino, todos de pequena extensão e volume, bem como os diversos filotes que os alimentam; sendo de maior importância os trechos de mata alagadiça que formam na floresta, constituindo habitat bem diversos da floresta não alagada. Também os lagos e pântanos situados fora da floresta são bem distintos em seu aspecto.

**Relevo, Geomorfologia e Solos** — Toda a Reserva Biológica de Sooretama, está compreendida no Terciário, denominado na região de Platô-Terciário, cuja altitude máxima não chega aos duzentos metros, e a média fica entre os 50-80 metros., sendo

mais baixa, nas margens do Rio Barra Seca. As chuvas têm nos meses de Novembro-Janeiro sua maior abundância, bem como nessa época a temperatura alcança sua máxima. Além da Série de Barreiras que abrange a maior parte da Geologia da Reserva Biológica de Sooretama, também se prolonga uma faixa sedimentária Quaternária. O solo predominante dessa área é o Podzólico vermelho amarelo e solos aluviais.

**Vegetação** — Toda a vegetação da Reserva Biológica de Sooretama, se situa na Província Atlântica, podendo acrescentar que é floresta próxima da Littorânea, uma vez que está essa área afastada entre 20 e 40 quilômetros da costa. É uma floresta Tropical por excelência, em área de Clima Tropical Especial, dada a baixa precipitação pluviométrica anual, que é inferior a 1.000 mm. em alguns anos. Além da mata alta, cujo dossel ultrapassa aos 40 metros, ela apresenta o segundo piso, com árvores até 20 metros e o terceiro piso, com arbustos, além do piso herbáceo, ou quarto piso. Nas matas de ravina, nos pântanos e lagos, e nas áreas abertas com pastagens e com matas secundárias e capoeiras sue progridem para uma reconstituição sinecológica lenta, se fixam as melhores mostragem dos diversos ecossistemas da Reserva de Sooretama. Na parte da floresta alta, nota-se a presença de um bom número de espécies botânicas arbóreas, sue abrangem as seguintes madeiras nobres: Destacando-se entre as demais: O jacarandá: *Dalbergia nigra* Fr. All. e a Peroba do campo: *Paratecoma peroba* Record. Seguindo-se das abaixo indicadas:

- Acá — *Pacystoma ilicifolium* Muell  
 Angico branco — *Piptadenia colubrina* Bth.  
 Araribá amarelo — *Centrolebium robustum* Mart.  
 Angico amarelo — *Piptadenia rigida* Bth.  
 Angelim pedra — *Hymenolobium excelsum* Ducke  
 Araroba — *Vataireopsis araroba* Aguiar  
 Amora — *Brosimum Gaudichaudii* Trec  
 Açoita cavalo — *Luhea divaricata* Mart.  
 Araribá vermelho — *Centrolebium tomentosum*  
 Araribá de cor — *Sickkyngia tinctoria* H.B.K.  
 Arruda vermelha — *Swartzia* sp.  
 Arruda rajada — *Swartzia* sp.  
 Angico vermelho — *Piptadenia macrocarpa* Bth.  
 Amesera — *Tapirira guianensis* Aubl.  
 Arapóca — *Raputia alba* Engl.  
 Amendoin balsamo — *Pterogyne nitens* Tul.  
 Braúna — *Melanoxylon brauna* Schott  
 Bicuiba-vermelha — *Virola gardneri* D.C.  
 Bicuiba branca — *Virola officinalis* Mart.  
 Bicuiba de óleo — *Virola oleifera* Schott  
 Boleira — *Joanesia princeps* Vell.  
 Balsamo ou Óleo pardo — *Myroxylon balsamum* Linn.  
 Cupá — *Bumelia obtusifolia* Roen e Schultz  
 Curubixá — *Sideroxylon gardnerianum* A. DC.  
 Canela fedorenta — *Nectandra puberula* R. e Pav.  
 Canela sassafrás — *Ocotea preciosa* Nees.  
 Canela preta — *Nectandra reticulata* R. e Pav.  
 Cobi faveira — *Piptadenia* sp.  
 Chorão — *Cassia ferruginea* Schrad.  
 Cabiúna — *Dalbergia nigra* Fr. All.  
 Cerejeira — *Touresia cearensis* Fr. All.  
 Canjerana-vermelha — *Cabralea multijuga* C. DC.  
 Cedro branco — *Cedrela fissilis* Vel.  
 Condurú — *Brosimum paraense* Huber.  
 Carne de vaca — *Roupala brasiliensis* Klotz.  
 Cafeeiro — *Maytenus alaternoides* Desf.  
 Copaíba — *Copaifera langsdorffi* Desf.  
 Caixeta — *Simaruba amara* Aubl.  
 Caixeta preta — *Tachigalia multijuga* Bth.  
 Embirassú — *Daphnopsis longifolia* Taub.

- Embirema — *Xylopia sericea* St. Hil.  
 Gameleira — *Ficus doliaria* Mart.  
 Grumê — *Ophthimoblaton macrophyllum* Fr. All.  
 Garapa — *Apuleia leiocarpa* Vog.  
 Guapuruvú — *Schizolobium parahyba* Vell.  
 Guatambú ou Tambú — *Aspidosperma ramiflorum* H. Arg.  
 Guanandí cedro — *Calophyllum brasiliense* Camb.  
 Guarantã — *Esenbeckia leiocarpa* Engl.  
 Inhuíba do régo — *Eschweilera* sp.  
 Ipê roxo, Ipê rosa — *Tabebuia heptaphylla* Vell.  
 Ipê amarelo ou Pau d'arco — *Tabebuia serratifolia* Vahl.  
 Itapicurú, Guarabú amarelo — *Goniorrhachis marginata* Taub.  
 Jataipéba — *Hymenaea stilbocarpa* Hayne  
 Jatobá — *Hymenaea courbaril* Linnaeus  
 Jutai-quebra machado — *Dialium guianensis* Aubl.  
 Jequitibá rosa — *Cariniana estrellensis* Raddi.  
 Jequitibá branco — *Cariniana legalis* Mart.  
 Jueirama rosa — *Pithecolobium pedicelare* Bth.  
 Jangada — *Apelba tibourbou* Aubl.  
 Laranjeira da mata — *Esenbeckia febrifuga* A. Juss.  
 Louro — *Cordia trichotoma* Vell.  
 Massaranduba — *Manilkara elata* Fr. All.  
 Macanaíba rosa — *Bowdichia rigida* Spruce.  
 Murici assú — *Vochysia verticillata* A. Dictr.  
 Mamão da mata — *Jaracatia dodecaphylla* Vell.  
 Mussutalpa — *Dalbergia foliosa* Bth.  
 Oiticica — *Clarisia racemosa* R. e Pav.  
 Orelha de onça — *Zollernia ilicifolia* Vog.  
 Oiti córoia — *Moquilea salzmanni* Hook.  
 Oiti de morcego — *Sacoglottis tomentosa* Bth.  
 Parajú — *Manilkara longifolia* DC.  
 Peroba do campo — *Paratecoma peroba* Record.  
 Peroba sobre — *Aspidosperma polineuron* M. Agr.  
 Pau-Brasil — *Caesalpinia echinata* Lam.  
 Pau pereira — *Geissospermum laeve* Vell.  
 Pau louro-branco — *Auxemma glaziouviana* Taub.  
 Pau-pombo — *Tapirira guianensis* Aubl.  
 Pau-marfim; Farinha seca — *Balfourodendron riedelianum* Engl.  
 Perobinha — *Sweetia elegans* Bth.  
 Pindaíba puruna — *Xylopia frutescens* Aubl.  
 Pitomba — *Talisia esculenta* Radlk.  
 Pau d'alho-Gorarema — *Gallesia gorazema* Vell.  
 Sapucáia — *Lecythis pisonis* Camb.  
 Sapucáia-assú — *Lecythis urnigera* Mart.  
 Sibipuruna — *Caesalpinia peltrophoroides* Bth.  
 Sobragi, Falso pau-brasil — *Colubrina rufa* Reiss.  
 Samuma-barriguda — *Cavanillesia arborea* Willd.  
 Sete-cascas — *Alehornia triplinervia* Mull. Arg.  
 Sucupira preta — *Bowdichia virgilloides* H.B.K.  
 Sucupira amarela — *Sweetia fruticosa* Spreng.  
 Sapucaína — *Carpotroche brasiliensis* Endl.  
 Tatú — *Eugenia axillaris* Vell.  
 Tapicurú amarelo — *Peltogyne confertiflora* Bth.  
 Tinto vermelho — *Ormosia nitida* Bth.  
 Tapinhoá — *Mezilaurus navallum* Fr. All.  
 Tapicurú preto ou Roxinho — *Peltogyne confertiflora* Hayne.  
 Vinhático — *Plathymenia foliosa* Benth.  
 Corindiba ou periquiera — *Trema micrantha* (L.) Blume.

Além de muitas outras árvores de médio e regular porte, bem como outros arbustos, destacando-se entre muitos as seguintes espécies dos Gêneros: *Swartzia*, *Fragaria*,

*Byrsonia*, *Myocarpus*, *Picraria*, *Vochysia*, *Poeppigia*, *Acacia*, *Eugenia*, *Hidrogaster*, *Modenaurea*, *Talium*, *Dioclea*, *Vernonia*, *Ouratea*, *Banara*, *Eschweilera*, *Senefeldera*, *Dimorphandra*, *Talisia*, *Lecmellea*, *Qualea*, *Eugenia*, *Kellmeyera* e *Meisteria*.

Ainda um número apreciável de plantas fornecedoras de látex, seja da mangabeira, *Hancornia speciosa* Gomez, ou da maniçoba ou ainda de muitas espécies da Família das *Sapotáceas* e também *Apocináceas*. Plantas ainda produtores de óleo, de cera, outras aromáticas, também ou ainda produtoras de substâncias medicinais, que ultrapassam de cem espécies.

Ainda representativo é o número de plantas escandentes, como as lianas de grande porte, como os cipós-escada, pertencentes às famílias *Leguminosae Apocinaeae*, além de outros das famílias: *Bignoniaceae*, *Araceae*, *Passifloraceae*, *Aristolochiaceae*, *Rubiaceae*, *Ranunculaceae*, *Meliaceae*, *Covulvulaceae*, *Sapindaceae*, *Cucurbitaceae*, *Compositas*, *Liliaceae*, *Asclepiadaceae* e outras, com também mais de 150 espécies.

Mais de 20 espécies de palmeiras. O avultado número de espécies de valor ornamental, destacando-se em especial as de folhagem suntuosa como as representantes das Famílias: *Heliconiaceae*, *Marantaceae*, *Begoniaceae*, *Zingiberaceae*, que em número também superior a cem espécies, formam a ornamentação do piso dessa floresta.

As epifitas que, embora não estejam representadas em igual número de uma floresta de encosta e montana, sempre seus representantes ultrapassavam ali de duzentas espécies, destacando-se entre elas, as representantes das Famílias: *Bromeliaceae*, *Orchidaceae*, *Araceae*, *Moraceae*, *Caetaceae*, *Piperaceae*, *Guttiferaceae*, *Begoniaceae* e *Gesneraceae*. Também com mais de cem espécies nessa floresta vivem representantes *Pteridófitas*, destacando-se entre outros os Gêneros: *Pteris*, *Polypodium*, *Nephrolepis*, *Adiantum*, *Ligodium*, *Anemia*, *Lycopodium*, *Urostachys*, *Hymenophyllum* e *Trychomanes*. Nesta Reserva se encontra a espécie em ameaça de extinção: *Laelia grandis*, é um dos poucos lugares, em que esta *Orquídeae* pode ser vista em seu habitat natural.

**FAUNA** — Além da notável apreensão da fauna invertebrada, principalmente da fauna entomológica, cujo avultado número de espécies é impressionante e cuja complexidade ainda perdurará, até que possa ser concluída ou levada a efeito, como ocorre para qualquer área de nosso país, a fauna vertebrada, já se torna muito mais fácil para determinar e dar uma relação representativa. É de certa forma rica e bem representada a fauna vertebrada na Reserva Biológica de Sooretama. Assim, embora não sendo a última listagem, devemos salientar ser a mais completa que conseguimos até esta data.

## MAMÍFEROS:

### Família DIDELPHIDAE:

- *Didelphis aurita* Wied-Neuwied, 1816. Gambá.
- *Metachirops opossum quica* Temminck, 1828. Chupati.
- *Metachirus nudicaudatus Myosurus* Temminck, 1829. Cuica.
- *Marmosa cinerea cinerea* Temminck, 1824. Catita.

### Família EMBALLONURIDAE:

- *Rhynchiseus naso* Wied-Neuwied, 1820. Morcegozinho de tromba.

### Família NOCTILIONIDAE:

- *Noctilio leporinus leporinus* Linnaeus, 1758. Morcego cachorro. Pescador.

### Família PHYLLOSTOMIDAE:

- *Phyllostomus hastatus hastatus* Pallas, 1767. Morcego de folha nasal em lança.
- *Trachops cirrhosus* Spix, 1823. Morcego de lábios enrugados.
- *Tonatia brasiliensis* Peters, 1866. Morcego de orelhas redondas.
- *Micronycteris megalotis megalotis* Gray, 1842. Morcegozinho de orelhas grandes.
- *Glossophaga soricina soricina* Pallas, 1766. Morcego chupa-flor.
- *Macrophyllum macrophyllum* Wied-Neuwied, 1825. Morcego com folha nasal
- *Lonchophylla modax* Thomas, 1903. Morcegozinho de focinho longo.
- *Anoura geoffroyi geoffroyi* Gray, 1838. Morcego sem cauda.
- *Artibeus jamaicensis planirostris* Spix, 1823. Morcego de fruta.

— *Vampyrops lineatus sacrillus* Tromas, 1924. Morcego cinza de estrias brancas.

**Família DESMODONTIDAE:**

— *Desmodus rotundus rotundus* E. Geoffroy S. Hilaire, 1820. Vampiro.  
— *Diphylla ecaudata ecaudata* Spix.

**Família VESPERTILIONIDAE:**

— *Myotis nigricans nigricans* Schinz, 1821. Morceguinho preto.  
— *Eptesicus brasiliensis brasiliensis* Desmarest, 1811. Morcego marron amarelado.

**Família MOLOSSIDAE:**

— *Molossus ates ates* E. Geoffroy S. Hilaire. 1805. Morcego do forro das igrejas.  
— *Eumops auripendulus* Shaw, Morceguinho de cauda comprida.

**Família NATALIDAE:**

— *Natalus stramineus espiritosantensis* Ruschi, 1951. Morceguinho pardo das folhas.

**Família CEBIDAE:**

— *Callicebus personatus personatus* E. Geoffroy, 1812. Sauá-assú.  
— *Callicebus melanochir* Kuhl, 1820. Guigó.  
— *Alouatta fusca fusca* E. Geoffroy, 1812. Barbado.  
— *Cebus robustus* Kuh, 1820. Macaco preto.

**Família CALLITHRICHIDAE:**

— *Callithrix penicillata penicillata* E. Geoffroy, 1812. Saguim da mata  
— *Callithrix leucocephala* E. Geoffroy, 1812. Saguim cara branca.

**Família MYRMECOPHAGIDAE:**

— *Myrmecophaga tridactyla tridactyla* Linnaeus, 1758. Tamanduá bandeira.  
— *Tamandua tetradactyla tetradactyla* Linnaeus, 1758. Tamanduá colete.

**Família BRADYPODIDAE:**

— *Bradypus torquatus* Illiger, 1811. Preguiça de coleira.

**Família DASYPODIDAE:**

— *Priodontes giganteus* E. Geoffroy, 1803. Tatú canastra.  
— *Dasybus novemcinctus novemcinctus* Linnaeus, 1758. Tatú galinha.  
— *Dasybus septemcinctus* Linnaeus, 1758. Tatú de milho.

**Família LEPORIDAE:**

— *Sylvilagus brasiliensis minensis* Thomas, 1901. Tapetí.

**Família SCIURIDAE:**

— *Sciurus ingrami ingrami* Thomas, 1901. Caxinguelé. Caticoco.

**Família CRICETIDAE:**

— *Oxymycterus hispidus* Pictet, 1843. Camundongo da mata.  
— *Oryzomys laticeps intermedius* Lecha, 1886. Rato do mato.  
— *Blarinomys breviceps* Winge, 1888. Rato da mata.

**Família MURIDAE:**

— *Rattus norvegicus norvegicus* Berkenhout, 1769. Ratazana.  
— *Rattus rattus rattus* Linnaeus, 1758. Rato de casa.  
— *Rattus rattus alexandrinus* E. Geoffroy, 1803. Rato pardo de casa.  
— *Mes musculus brevirostris* Waterhouse, 1837. Camundongo.

**Família ERETHIZONTIDAE:**

— *Coendou prehensilis prehensilis* Linnaeus, 1758. Ouriço cacheiro.

**Família CAVIIDAE:**

— *Cavia aperea aperea* Erxleben, 1777. Preá.

Família **HYDROCHOERIDAE:**

- *Hydrochoerus hydrochoeris hydrochoeris* Linnaeus, 1762. Capivara.

Família **DASYPROCTIDAE:**

- *Dasyprocta aguti aguti* Linnaeus, 1766. Cotia.  
— *Cuniculus paca paca* Linnaeus, 1760. Paca.

Família **ECHIMYIDAE:**

- *Proechimys iheringi panema* Moojen, 1948. Rato subterrâneo.  
— *Euryzomatomys guirara* Brandt, 1835. Rato guirá.  
— *Echimys medius* Thomas, 189. Rato de espinho.  
— *Echimys brasiliensis* Lund, 1841. Rato de espinho do litoral.  
— *Kannabateomys amblyonyx amblyonyx* Wagner, 1845. Rato da taquara.

Família **CANIDAE:**

- *Dusleyon vetulus vetulus* Lund, 1842. Raposa do campo.

Família **PROCYONIDAE:**

- *Procyon cancrivorus nigripes* Mivart, 1885. Mão pelada.  
— *Nasua nasua nasua* Linnaeus, 1766. Coati de bando.  
— *Potus flavus nocturnus* Wied, 1826. Juparaná. Macaco da noite.

Família **MUSTELIDAE:**

- *Tayra barbara gulina* Schinz, 1821. Irara.  
— *Grison vittatus brasiliensis* Thunberg, 1820. Furão. Giricaca.  
— *Lutra enudris enudris* Cuvier, 1823. Lontra.

Família **FELIDAE:**

- *Felis concolor greeni* Nelson e Goldman, 1931. Suçuarana.  
— *Panthera onca onca* Linnaeus, 1758. Onça pintada.  
— *Felis pardalis brasiliensis* Oken, 1816. Jaguaritica.  
— *Felis wiedii wiedii* Schinz, 1821. Gato maracajá.  
— *Felis yaguarondi yaguarondi* Lacépède, 1808. Gato mourisco.

Família **TAPIRIDAE:**

- *Tapirus terrestris terrestris* Linnaeus, 1758. Anta.

Família **TAYASSUIDAE:**

- *Tayassu pecari pecari* Link, 1795. Queixada.  
— *Tayassu tajacu tajacu* Linnaeus, 1758. Porco do mato. Caitetú.

Família **CERVIDAE:**

- *Mazama americana americana* Erxleben, 1777. Veado mateiro.  
— *Mazama simplicornis simplicornis* Illiger, 1811. Veadoatingueiro.

**AVES:**

Família **TINAMIDAE:**

- *Tinamus solitarius solitarius* Vieillot, 1819. Macuco. SOLITARY TINAMOU.  
— *Crypturellus soul albicularis* Brabourne e Chubb, 1914. Tururim. LITTLE TINAMOU.  
— *Crypturellus noctivagus noctivagus* Wied, 1820. Jaó. YELLOW-LEGGED TINAMOU.  
— *Crypturellus variegatus variegatus* Gmelin, 1789. Chororão. VARIEGATED TINAMOU.  
— *Crypturellus tataupa tataupa* Temminck, 1815. Inhambú chitã. TATAUPA TINAMOU.

Família **PODICIPEDIDAE:**

- *Tachybaptus dominicus brachyrhynchus* Chapman, 1899. Paca-Parra. LEAST-CREBE.

- *Podilymbus podiceps antarcticus* Lesson, 1842. Mergulhão caçador. **PIED-BILLED-CREBE.**

Família **ANHINGIDAE:**

- *Anhinga anhinga anhinga* Linnaeus, 1766. Biguá-tinga. **ANHINGA.**

Família **PREGATIDAE:**

- *Fregata magnificens* Mathews, 1914. Tezoura. Pregata. **MAGNIFICENT FRI-GATEBIRD.**

Família **ARDEIDAE:**

- *Botaurus pinnatus pinnatus* Wagler, 1829. Socó-bol. **PINNATED-BITTERN.**  
 — *Ixobrychus exilis erithromelas* Vieillot, 1817. Socó-mirim. **LEAST BITTERN.**  
 — *Tigrisoma lineatum marmeratum* Vieillot, 1817. Socó-boi. **RUFESCENT TIGER-HERON.**  
 — *Tigrisoma fasciatum fasciatum* Such, 1825. Socó-boi. **FASCIATED TIGER-HERON.**  
 — *Nycticorax nycticorax heactli* Gmelin, 1789. Socó dorminhoco. **BLACK-CROWNED NIGHT-HERON.**  
 — *Nyctanassa violacea cayennensis* Gmelin, 1789. Sabacu de coroa. **YELLOW-CROWNED NIGHT-HERON.**  
 — *Ptilherodius pileatus* Boddaert, 1783. Garça de topete preto. **CAPPED HERON.**  
 — *Cochlearius cochlearius cochlearius* Linnaeus, 1766. Arapá-pá. **BOAT-BILLED HERON.**  
 — *Butorides striatus striatus* Linnaeus, 1758. Cocósinho. **STRIATED HERON.**  
 — *Egretta alba egretta* Linnaeus, 1758. Garça branca grande. **GREAT EGRET.**  
 — *Egretta caerulea* Linnaeus, 1758. Garça azul. **LITTLE BLUE HERON.**  
 — *Egretta thula thula* Molina, 1782. Garcinha branca. **SNOWY EGRET.**  
 — *Ardea cocoi* Linnaeus, 1766. Magoari. **WHITE-NECKED HERON.**

Família **CICONIIDAE:**

- *Mycteria americana* Linnaeus, 1758. Cabeça seca. **WOOD STORK.**  
 — *Ciccassia maguari* Gmelin, 1789. Maguari. **MAGUARI STORK.**  
 — *Jabiru mycteria* Lichtenstein, 1819. Jaburú. **JABIRU.**

Família **ANATIDAE:**

- *Dendrocygna bicolor* Vieillot, 1816. Marréca péba. **PULVOUS TREE-DUCK.**  
 — *Dendrocygna viduata* Linnaeus, 1766. Marréca piadeira. **WHITE-FACED TREE-DUCK.**  
 — *Dendrocygna autumnalis discolor* Sclater e Salvin, 1873.  
 — *Anas bahamensis bahamensis* Linnaeus, 1758. Marréca tucinho. **WHITE-CHEEKED PINTAIL.**  
 — *Anas platyles* Vieillot, 1816. Marréca pintada. **RED CHOVELER.**  
 — *Netta erythrophthalma erythrophthalma* Wied, 1832. Marréca pé preto. **SOUTHERN POCHARD.**  
 — *Amazonetta brasiliensis brasiliensis* Gmelin, 1789. Marréca ananai. **BRASILIAN DUCK.**  
 — *Sarkidiornis melanotos sylvicola* Ihering e Ihering, 1907. Pato preto. **COMB DUCK.**  
 — *Cairina moschata* Linnaeus, 1758. Pato de crista. **MUSCOVY DUCK.**  
 — *Oxyura dominica* Linnaeus, 1766. Marrequinha. **MASKED DUCK.**

Família **CATHARTIDAE:**

- *Sarcoramphus papa* Linnaeus, 1758. Urubú-rei. **KING VULTUR.**  
 — *Coragys atratus brasiliensis* Bonaparte, 1850. Urubú preto. **BLACK VULTURE.**

Família **PANDIONIDAE:**

- *Pandion haliaetus carolinensis* Gmelin, 1788. Gavião pescador. **OSPREY.**

Família **ACCIPITRIDAE:**

- *Leptodon cayanensis* Latham, 1790. Gavião cinza e branco. **GRAY-HEADED KITE.**

- *Chondrohierax uncinatus uncinatus* Temminck, 1822. Gavião cauda zebraada. HOOK-BILLED KITE.
- *Elanoides forficatus yetapa* Vieillot, 1818. Gavião tezoura. SWALLOW-TAILED KITE.
- *Gampsonyx swainsonii swainsonii* Vigors, 1825. Gaviãozinho. PEARL KITE.
- *Rostrhamus sociabilis sociabilis* Vieillot, 1817. Gavião caramujeiro. SNAIL KITE.
- *Harpagus bidentatus bidentatus* Latham, 1799. Gavião bidentado. DOUBLE-TOOTHED KITE.
- *Harpagus diodon* Temminck, 1823. Gavião negro-cinza. RUFIOUS-THIGHED KITE.
- *Ictinia plumbea* Gmelin, 1788. Gavião formiga. PLUMBEUS KITE.
- *Geranospiza caerulescens gracilis* Temminck, 1821. Gavião cinza listrado. CRANE-HAWK.
- *Circus buffoni* Gmelin, 1788. Gavião cabeça preta e branca. LONG-WINGED HARRIER.
- *Accipiter superciliosus superciliosus* Linnaeus, 1766. Gaviãozinho. TINY HAWK.
- *Accipiter bicolor pileatus* Temminck, 1823. Gavião bicolor. BICOLORED HAWK.
- *Accipiter polioaster* Temminck, 1824. Tauató pintado. GRAY-BELLIED HAWK.
- *Accipiter striatus erythronemius* Kaup, 1850. Gavião pega-pinto. SHARP-SHINNED HAWK.
- *Leucopternis lacernulata* Temminck, 1827. Gavião-pomba. WHITE-NECKED HAWK.
- *Leucopternis polionota* Kaup, 1847. Gavião-pomba. MANTLED HAWK.
- *Buteogallus urubitinga urubitinga* Gmelin, 1788. Gavião cauá. GREAT BLACK HAWK.
- *Buteogallus aequinoctialis* Gmelin, 1788. Gavião do mangue. RUFIOUS CRAB HAWK.
- *Heterospizias meridionalis meridionalis* Latham, 1790. Gavião caboclo. SAVANNA HAWK.
- *Busarellus nigricollis nigricollis* Latham, 1790. Gavião velho. BLACK-COLLARED HAWK.
- *Parabuteo unicinctus unicinctus* Temminck, 1824. Gavião grande preto. BAYWINGD HAWK.
- *Buteo albicaudatus albicaudatus* Vieillot, 1816. Gavião branco. WHITE-TAILED HAWK.
- *Buteo magnirostris magniplumis* Bertoni, 1901. Gavião carijó. ROADSIDE HAWK.
- *Buteo nitidus nitidus* Latham, 1790. Gavião pedrêz. GRAY HAWK.
- *Buteo leucorrhous* Quoy e Galmard, 1824. Gaviãozinho cauda branca. WHITE-RUMPED HAWK.
- *Buteo brachyurus brachyurus* Vieillot, 1816. Gavião cauda curta. SHORT-TAILED HAWK.
- *Morphus guianensis* Daudin, 1800. Gavião de penacho. CRESTED EAGLE.
- *Harpia haryia* Linnaeus, 1758. Harpia. Gavião real. HARPY EAGLE.
- *Spizastur melanoleucus* Vieillot, 1816. Gavião pato. BLACK-AND-WHITE HAWK-EAGLE.
- *Spizaetus tyrannus tyrannus* Wied, 1820. Gavião pega macaco. BLACK HAWK-EAGLE.
- *Spizaetus ornatus ornatus* Daudin, 1801. Gavião-de-penacho. ORNATE HAWK-EAGLE.

#### Família FALCONIDAE:

- *Caracara planus planus* Miller, 1777. Cará-cará. CRESTED CARACARA.
- *Milvago chimachima chimachima* Vieillot, 1816. Pinhé. Carrapateiro. YELLOW-HEADED CARACARA.
- *Herpetoethers caerinnaus cachinnans* Linnaeus, 1758. Acuá. LAUGHING FALCON.
- *Micrastur ruficollis gilvicollis* Vieillot, 1817. Gavião mateiro. BARRED FOREST-FALCON.



- *Micrastur mirandollis* Schlegel, 1862. Gavião cauda curta estriada. SLATY-BACKED FOREST-FALCON.
- *Falco sparverius cearae* Cory, 1915. Gaviãozinho. Quiri-quiri. AMERICAN KESTREL.
- *Falco rufigularis rufigularis* Daudin, 1800. Gavião morcegueiro. BAT FALCON.
- *Falco peregrinus anatum* Bonaparte, 1858. Gavião peregrino. PEREGRINE FALCON.

Família CRACIDAE:

- *Ortalis guttata araucuan* Spix, 1825. Aracua. SPECKLED CHACHALAGA.
- *Penelope superciliaris jacupemba* Spix, 1825. Jacupemba. RUSTY-MARGINED GUAN.
- *Penelope obscura bronzinga* Hellmayr, 1914. Jacu-assu. DUSKY-LEGGED GUAN.
- *Pipile jacutinga* Spix, 1825. Jacutinga. BLACK-FRONTED PIPING-GUAN.
- *Grax blumenbachi* Spix, 1825. Mutum. RED-BILLED CURASSOW.

Família PHASIANIDAE:

- *Odontophorus capueira capueira* Spix, 1825. Urú. Capueira. SPOT-WINGED WOOD-QUAIL.

Família ARAMIDAE:

- *Aramus guarauna guarauna* Linnaeus, 1766. Corão. Caramujeiro. LIMPKIN.

Família RALLIDAE:

- *Rallus sanguinolentus zelebori* Pelzelin, 1965. Saracura sanã. PLUMBEOUS RAIL.
- *Rallus nigricans nigricans* Vieillot, 1819. Saracura preta. BLACKISH RAIL.
- *Rallus longirostris crassirostris* Lawrence, 1871. Saracura do mangue. CLAPPER RAIL.
- *Rallus maculatus maculatus* Boddaert, 1783. Saracura carijó. SPOTTED RAIL.
- *Aramides mangle* Spix, 1825. Saracura sanã do mangue. LITTLE WOOD-RAIL.
- *Aramides cajanea cajanea* P.L.S. Muller, 1776. Três-potes. GRAY-NECKED WOOD-RAIL.
- *Porzana albicollis albicollis* Vieillot, 1819. Sanã. ASH-THROATED CRAKE.
- *Laterallus melanophaius melanophaius* Vieillot, 1819. Pinto água. RUFOUS-SIDED CRAKE.
- *Gallinula chloropus galeata* Lichtenstein, 1818. Frango água. COMMON GALLINULE.
- *Porphyryna martinica* Linnaeus, 1776. Frango água azul. PURPLE GALLINULA.
- *Fulica armillata* Vieillot, 1817. Galinha água. RED-GARTERED COOR.

Família HELIORNITHIDAE:

- *Helionis fulica* Boddaert, 1783. Mergulhão caçador. SUNGREBE.

Família JACANIDAE:

- *Jacana jacana jacana* Linnaeus, 1766. Jaçaná. Piaçoca. WATILED JACANA.

Família HAEMATOPODITAE:

- *Haematopus palliatus palliatus* Temminck, 1820. Ostreiro. AMERICAN OYSTERCATCHER.

Família CHARADRIIDAE:

- *Vanellus chilensis cayennensis* Gmelin, 1789. Quéro-quéro. SOUTHERN LAPWING.
- *Hoploxypterus cayanus* Latham, 1790. Maçarico de espora. PIED LAPWING.
- *Pluvialis squartola* Linnaeus, 1758. Maçarico bico preto. BLACK-BELLIED PLOWER.
- *Charadrius semipalmatus* Bonaparte, 1758. Maçarico semipalmado. SEMIPALMATED PLOWES.
- *Charadrius collaris* Vieillot, 1818. Maçarico de coleira. COLLARED PLOWER.

## Família SCOLOPACIDAE:

- *Actitis macularia* Linnaeus, 1766. Maçarico salpicado. SPOTTED SANDPIPER.
- *Arenaria interpres morinella* Linnaeus, 1766. Maçarico americano. RUDY TURNSTONE.
- *Tringa solitaria solitaria* Wilson, 1813. Maçarico solitário. SOLITARY SAND-PIPER.
- *Gallinago gallinago paraguayae* Vieillot. Marceja. COMMON SNIPE.
- *Gallinago undulata gigantea* Temminck, 1826. Marcejão GIANT SNIPE.
- *Calidris alba* Pallas, 1764. Maçarico. SANDERLING.
- *Calidris melanotos* Vieillot, 1819. Maçarico peito negro. PECTORAL SAND-PIPER.

## Família R5CURVIROSTRIDAE:

- *Himantopus himantopus melanurus* Vieillot, 1817. Maçarico bico virado. COMMON STILT.

## Família LARIDAE:

- *Larus maculipennis* Lichtenstein, 1823. Gaivota escura. BROWN-HOODED GULL.
- *Larus cirrocephalus cirrocephalus* Vieillot, 1818. Gaivota cinza. GRAY-HOODED GULL.
- *Sterna nilotica groevoldi* Mathews, 1912. Andorinha do mar. GULL-BILLED TERN.
- *Sterna hirundinacea* Lesson, 1831. Trinta-réis. SOUTH AMERICAN TERN.
- *Sterna superciliiaris* Vieillot, 1819. Gaivota bico amarelo. YELLOW-BILLED TERN.

## Família COLUMBIDAE:

- *Columba speciosa* Gmelin, 1789. Pombo pedrêz. SCALED PIGEON.
- *Columba cayennensis sylvestris* Vieillot, 1818. Pocaçú. PALE-VENTED PIGEON.
- *Columba plumbea plumbea* Vieillot, 1818. Amargosa. PLUMBEOUS PIGEON.
- *Columbina minuta minuta* Linnaeus, 1766. Rolinha. PLAIN-BREADED GROUD-DOVE.
- *Columbina talpacoti talpacoti* Temminck, 1811. Rola cabocla. RUDY GROUND-DOVE.
- *Scardafella squammata squammata* Lesson, 1831. Fogo-apagou. SCALED DOVE.
- *Claravis pretiosa* Ferrari-Peres, 1886. Rola azul. BLUE GROUND-DOVE.
- *Leptotila verreauxi decipiens* Salvadori, 1871. Juriti. WHITE-TIPPED DOVE.
- *Geotrygon montana montana* Linnaeus, 1758. Juriti da mata. RUDDY QUAIL-DOVE.

## Família PSITTACIDAE:

- *Ara chloroptera* Gray, 1859. Arara vermelha. RED-AND-GREEN MACAW.
- *Ara severa severa* Linnaeus, 1758. Ararinha. CHESTNUT-FRONTED MACAW.
- *Aratinga aurea aurea* Gmelin, 1789. Periquito estrela. PEACH-FRONTED PARAKET.
- *Pyrrhura cruentata* Wied, 1820. Fura-mato grande. ICHRE-MARKED PARAKET.
- *Pyrrhura leucotis leucotis* Kuhl, 1820. Fura-mato pequena. MAROGN-FACED PARAKET.
- *Brotogeris viridissimus* Kuhl, 1820. Periquito verde. PLAIN PARAKET.
- *Forpus crassirostris vividus* Ridgway, 1888. Tuin. BLUE-WINGED PARROTLET.
- *Pionus menstruus reichenowi* Heine, 1884. Maitaca. BLUE-HEADED PARROT.
- *Pionus maximiliani maximiliani* Kuhl, 1820. Maitaca suia. SCALY-HEADED PARROT.
- *Pionus fuscus* Muller, 1776. Maitaca roxa. RED-BILLED PARROT.
- *Amazona vinacea* Kuhl, 1820. Papagaio de peito roxo. VINACEOUS-BREADED PARROT.
- *Amazona aestiva aestiva* Linnaeus, 1758. Papagaio verdadeiro. TURQUOISE-FRONTED PARROT.
- *Amazona farinosa farinosa* Boddaert, Papagaio jurú. MEALY PARROT.

- *Amazona dusfresniana rhodocorytha* Salvadori, 1812. Papagaio chuá. BLUE-CHEEKED PARROT.

Família CUCULIDAE:

- *Coccyz euleri* Cabanis, 1873. Papa-lagarta. PEARLY-BREASTED CUCKOO.
- *Playa cayana macroura* Gambel, 1849. Rabilonga. SQUIRREL CUCKOO.
- *Tapera naevia chochi* Vieillot, 1817. Saci. STRIPED CUCKOO.
- *Dromococcyx phasianellus phasianellus* Spix, 1824. Peixe-frito da mata. PHEASANT CUCKOO.
- *Crotophaga major* Gmelin, 1788. Anú-cória. GREATER ANI.
- *Crotophaga ani* Linnaeus, 1758. Anú preto. SMOOTH-BILLED ANI.
- *Guira guira* Gmelin, 1788. Anú branco. GUIRA CUCKOO.
- *Neomorphus geoffroyi dulcis* Sneath, 1927. Jacú de estalo. GREEN GROUND-CUCKOO.

Família TYTONIDAE:

- *Tyto alba tuidara* Gray, 1767. Coruja de igreja. BARN OWL.

Família STRIGIDAE:

- *Rhinoptynx clamator clamator* Vieillot, 1807. Mocho orelhudo. STRIPED OWL.
- *Otus choliba choliba* Vieillot, 1817. Caburé do campo. TROPICAL SCRESCH-OWL.
- *Otus atricapillus atricapillus* Temminck, 1822. Caburé de orelhas. LONG-TUFFED ACREECH-OWL.
- *Pulsatrix perspicillata pulsatrix* Wied, 1820. Corujão mateiro. SPETACLED OWL.
- *Pulsatrix koeniswaldiana* Bertoni e Bertoni, 1901. Corujão da mata. TAWNY-BROWED OWL.
- *Glaucidium brasilianum brasilianum* Gmelin, 1788. Caburé de sol. FERRUGINOUS PYGMY-OWL.
- *Speotyto cunicularia grallaria* Temminck, 1822. Caburé do pasto. BURROWING OWL.
- *Ciccaba hulula albomarginata* Spix, 1824. Coruja carijó. BLACK-BANDED OWL.

Família NYCTIBIDAE:

- *Nyctibius grandis grandis* Gmelin, 1788. Urutáu cinzento. GREAT POTOO.
- *Nyctibius aethereus aethereus* Wied, 1820. Urutáu marron. LONG-TAILED POTOO.
- *Nyctibius griseus griseus* Gmelin, 1789. Urutáu pequeno. COMMON POTOO.

Família CAPRIMULGIDAE:

- *Lurocalis semitorquatus mattereri* Temminck, 1822. Tajú. SEMICOLLARED NIGHTHAWK.
- *Podager nacunda nacunda* Vieillot, 1817. Tion-tion. NACUNDA NIGHTHAWK.
- *Cordelies acutipennis acutipennis* Hermann, 1783. Bacuráu. LESSER NIGHTHAWK.
- *Nyctidromus albicollis derbynus* Gould, 1838. Amanhã-eu-vou. PAURAQUE.
- *Caprimulgus rufus rufus* Boddaert, 1783. Bacuráu. RUFOUS NIGHTJAR.
- *Nyctinifrinus ocellatus ocellatus* Tschudi, 1844. Bacurauzinho da mata. OCELLATED POORWILL.

Família APODIDAE:

- *Streptoprocne zonaris zonaris* Shaw, 1796. Andorinhão coleira. WHITE-COLLARED SWIFT.
- *Streptoprocne biscutata* Sclater, 1865. Andorinhão temporal. BISCUTATE SWIFT.
- *Cypseloides fumigatus fumigatus* Streubel, 1848. Tapera pequena. SOOTY SWIFT.
- *Chaetura cinereiventris cinereiventris* Sclater, 1862. Tapera das queimadas. GRAY-RUMPED SWIFT.

- *Reinarda squamata orientalis* Cassin, 1853. Tapera da palmeira. FORK-TAILED PALM SWIFT.

Família **TROCHILIDAE:**

- *Glaucis hirsuta hirsuta* Gmelin, 1788. Balança rabo do bico curvo. RUFOUS-BREADED HERMIT.
- *Phaethornis pretrei pretrei* Lesson e Delattre. Beija-flor de rabo branco. PLANALTO HERMIT.
- *Phaethornis ruber ruber* Linnaeus, 1758. Bezourinho marron da mata. REDDISH HERMIT.
- *Phaethornis idaliae* Bourcier e Mulsant, 1856. Bezourinho escuro da mata. OBSCURE HERMIT.
- *Eupetomena macroura macroura* Gmelin, 1788. Tezourão. SWALLOW-TAILED HUMMINGBIRD.
- *Metanotrochilus fuscus* Vieillot, 1817. Beija-flor preto. BLACK JACOBIN.
- *Colibri serrirostris* Vieillot, 1816. Orelhudo. WHITE-VENTED VIOLETEAR.
- *Anthracothorax nigricollis nigricollis* Vieillot, 1817. Beija-flor frente preta. BLACK-THROATED MANGO.
- *Chrysolampis mosquitus* Linnaeus, 1758. Beija-flor vermelho. RUBY-TOPAZ HUMMINGBIRD.
- *Lophornis magnifica* Vieillot, 1817. Topetinho vermelho. FRILLED COQUETTE.
- *Lophornis chalybea chalybea* Vieillot, 1823. Topetinho preto. FESTIVE COQUETTE.
- *Popelairia langsdorffi langsdorffi* Temminck, 1821. Rabo de marfim. BLACK-BELLIED THORNTAIL.
- *Discosura longicauda* Gmelin, 1788. Pavãozinho. RACKET-TAIL COQUETTE.
- *Chlorestes notatus cyanogenys* Wied, 1832. Beija-flor verde de garganta azul. BLUE-CHINNED SAPPHIRE.
- *Chlorostilbon aureoventris pucherani* Bourcier e Mulsant, 1848. Beija-flor verde ouro dourado. GLITTERING-BELLIED EMERALD.
- *Thalurania galucopsis* Gmelin, 1788. Tezoura de cabeça violeta. VIOLET-CAPPED WOODNYMPH.
- *Hylocharis sapphirina sapphirina* Gmelin, 1788. Garganta marron e azul. RUFOUS-THROATED SAPPHIRE.
- *Hylocharis cyanus cyanus* Vieillot, 1818. Roxinho de bico vermelho. WHITE-CHINNED SAPPHIRE.
- *Leucochloris albicollis* Vieillot, 1818. Papo branco. WHITE-THROATED HUMMINGBIRD.
- *Polytmus guainumbi thaumantias* Linnaeus, 1766. Verde ouro de bico curvo. TERN GOLDENTHROAT.
- *Amazilia versicolor versicolor* Vieillot, 1818. Garganta verde-azulada furtacêr. VERSICOLED EMERALD.
- *Amazilia fimbriata nigricauda* Elliot, 1878. Verde pequeno de cauda negra. BLAKED-TAILED EMERALD.
- *Amazilia fimbriata tephrocephala* Vieillot, 1818. Verde grande de ventre branco. BRAZILIAN EMERALD.
- *Amazilia lactea lactea* Lesson, 1829. Verde de peito safira. SAPPHIRE-SPAN-GLED EMERALD.
- *Aphantochroa cirriochloris* Vieillot, 1818. Beija-flor cinza. SOMBRE HUMMINGBIRD.
- *Heliothryx aurita auriculata* Nordmann, 1835. Bico de sabre verde e branco. GREEN-CHINNED FAIRY.
- *Heliomaster squamosus* Temminck, 1823. Bico grande verde. STRIPE-BREADED STAR-THROAT.
- *Calliphlox amethystina amethystina* Boddaert, 1783. Tezourinha ametista. AMATHYS WOODSTAR.

Família **TROGONIDAE:**

- *Trogon rufus chrysochlorus* Pelzeln, 1856. Surucuá de pescoço preto. BLACK-THROATED TROGON.

- *Trogon collaris eytoni* Frazer, 1857. Surucua barriga vermelha. COLLARED TROGON.
- *Trogon viridis melanopterus* Swainson, 1838. Surucua barriga amarela. WHITE-TAILED TROGON.

Família **ALCEDINIDAE**:

- *Ceryle torquata torquata* Linnaeus, 1766. Martim-pescador grande. RINGED KINGFISHER.
- *Chloroceryle amazona amazona* Lathan, 1790. Martim pescador. AMAZON KINGFISHER.
- *Chloroceryle americana mathewsii* Laubmann, 1927. Martim pescador verde. GREEN KINGFISHER.
- *Chloroceryle aenea aenea* Pallas, 1764. Martim pescador pequeno. PYGMY KINGFISHER.

Família **MOMOTIDAE**:

- *Baryphengus ruficapillus ruficapillus* Vieillot, 1818. Jurúva. RUFOUS MOTMOT.

Família **GALBULIDAE**:

- *Galbula ruficauda rufoviridis* Cabanis, 1851. Beija-flor da mata. THREETOED JACAMAR.
- *Notharchus macrohynchus swainsoni* G. R. Gray, 1846. Capitão do mato. WHITE-NECKED PUFFBIRD.
- *Ma'acoptila striata striata* Spix, 1824. João barbudo. CRESCENT-CHESTED PUFFBIRD.
- *Nonnula rubecula rubecula* Spix, 1824. João bobo. RUSTY-BREASTED NUNLET.
- *Chelidoptera tenebrosa brasiliensis* Sclater, 1862. Miolinho. SWALLON-WING

Família **RAMPHASTIDAE**:

- *Ramphastos vitellinus ariel* Vigors, 1826. Tucano bico preto. BLACK-BILLED TOUCAN.
- *Ramphastos dicolorus* Linnaeus, 1766. Tucano bico verde. RED-BREASTED TOUCAN.
- *Pteroglossus aracari wiedii* Sturn, 1487. Araçari. BLACK-NECKED ARACARI
- *Selenidera maculirostris maculirostris* Lichtenstein, 1823. Araçari-póca. SPOT-BILLED TOUCANET.
- *Bailloni bailloni* Vieillot, 1817. Araçari-banana. SAFFRON TOUCANET.

Família **PICIDAE**:

- *Picumnus cirratus cirratus* Temminck, 1825. Picapauzinho. WHITE-BARRET PICULET.
- *Picumnus exilis exilis* Lichtenstein, 1823. Picapauzinho amarelado. GOLDEN-SPANGLED PICULET.
- *Colaptes campestris campestris* Vieillot, 1818. Picapau do campo. CAMPOS ELICKER.
- *Chrysophilus melanochloros melanochloros* Gmelin, 1788. Picapau carlió. GREEN-BARRED WOODPECKER.
- *Piculus chrysochloros polyzenus* Valenciennes, 1826. Picapau verde listado. GOLDEN-GREEN WOODPECKER.
- *Ceolus flavescens flavescens* Gmelin, 1788. Picapau cabeça amarela. BLOND-CRESTED WOODPECKER.
- *Ceolus flavus subflavus* Sclater e Salvin, 1877. Picapau creme. GREAM-COLORED WOODPECKER.
- *Melanerpes flavifrons flavifrons* Vieillot, 1818. Picapau fronte amarela. YELLOW-FRONTED WOODPECKER.
- *Leuconerpes candidus* Otto, 1776. Picapau branco. WHITE WOODPECKER.
- *Veniliornis spilogaster* Wagler, 1827. Picapau pintado de branco. WHITE-SPOTTED WOODPECKER.
- *Veniliornis maculifrons* Spix, 1824. Picapau de olho amarelo) YELLOW-EARED WOODPECKER.

- *Dryocopus lineatus erythroptus* Valenciennes, 1826. Picapau lista branca na cabeça. LINEATED WOODPECKER.
- *Campephilus robustus* Lichtenstein, 1818. Picapau gigante. ROBUST WOODPECKER.
- *Campephilus melanoleucos albirostris* Vieillot, 1818. Picapau topete carmim. CRIMSON-CRESTED.

Família DENDROCOLAPTIDAE:

- *Xiphocolaptes albicollis albicollis* Vieillot, 1818. Arapaçú de garganta branca. WHITE-THROATED WOODCREEPER.
- *Dendrocolaptes platirostris platirostris* Spix, 1825. Arapaçú grande. PLANALTO WOODCREEPER.
- *Xiphorhynchus guttatus guttatus* Lichtenstein, 1820. Arapaçú vermelho. BUFF-THROATED WOODCREEPER.
- *Lepidocolaptes fuscus fuscus* Vieillot, 1818. Arapaçú. LESSER WOODCREEPER
- *Campylorhamphus trochilirostris trochilirostris* Lichtenstein, 1820. Arapaçú-beija-flor. RED-BILLED SCYTHEBILL.
- *Campylorhamphus falcularius* Vieillot, 1822. Arapaçú bico preto. BLACK-BILLED SCYTHEBILL.
- *Dendrocincla fuliginosa turdina* Lichtenstein, 1820. Subideira. PLAIN-BROWN WOODCREEPER.
- *Glyphorhynchus spirurus cuneatus* Lichtenstein, 1820. Arapaçú. WEDGE-BILLED WOODCREEPER.
- *Sittasomus griseicapillus sylvellus* Temminck, 1821. Arapaçú oliváceo. OLIVACEOUS WOODCREEPER.

Família FURNARIIDAE:

- *Furnarius rufus badius* Lichtenstein, 1823. João de barro. RUFOUS HORNERO
- *Furnarius figulus figulus* Lichtenstein, 1823. João de barro. WING-BANDED HORNERO.
- *Synallaxis ruficapilla ruficapilla* Vieillot, 1819. João-tem-tem. RUFOUS-CAPPED SPINETAIL.
- *Synallaxis spixi* Sclater, 1856. João teneném. CHICLI SPINETAIL.
- *Synallaxis cinerascens* Temminck, 1823. João teneném cinza. GRAY-BELLIED SPIGETAIL.
- *Cranieuca pallida* Wied, 1831. Benterêrê. PALLID SPINETAIL.
- *Certhiaxis cinnamomea russeola* Vieillot, 1817. Corruira do brejo. YELLOW-THROATED SPINETAIL.
- *Thripophaga macroura* Wied, 1821. Rabo estriado. STRIATED SOFTTAIL.
- *Phacelodromus rufifrons rufifrons* Wied, 1821. Carrega páu. RUFOUS-FRONTED THORNBIRD.
- *Phacelodromus erythrophthalmus erythrophthalmus* Wied, 1821. João cortapáu. RED-EYED THORNBIRD.
- *Syndaactyla rufosuperciliata rufosuperciliata* Lafresnaye, 1832. Limpador de folha. BUFF-BROWED FOLIAGE-CLEANER.
- *Philydor atricapillus* Wied, 1821. Limpa folha de cabeça negra. BLACK-CAPPED FOLIAGE-CLEANER.
- *Philydor lichtensteini* Cabanis e Heine, 1859. Limpa folha-ocre. OCHRE-BREASTED FOLIAGE-CLEANER.
- *Philydor rufus rufus* Vieillot, 1818. Limpa folha-camurça. BUFF-FRONTED FOLIAGE-CLEANER.
- *Automolus leucophthalmus sulphurascens* Lichtenstein, 1823. Limpa folha de olho branco. WHITE-EYED FOLIAGE CLEANER.
- *Cichocolaptes leucophrys* Jardine e Selby, 1830. Limpa folha-ferrugem. PALE-BROWED TREEHUNTER.
- *Heliobletus contaminatus* Berlepsch, 1885. Caçador de árvore. SHARP-BILLED TREEHUNTER.
- *Xenops minutus minutus* Sparrman, 1788. Caçador de árvore pequeno. PLAIN XENOPS.
- *Xenops rutilans rutilans* Temminck, 1821. Caçador de árvore estriado. STREAKED XENOPS.

- *Sclerurus scansor scansor* Ménériés, 1835. Vira-folhas. RUFOUS-BREAISED LEAFSCRAPER.
- *Sclerurus caudacutus umbretta* Lichtenstein, 1823. Vira-folha cauda negra. BLACK-TAILED LEAFSCRAPER.
- *Lochmias nematura nematura* Lichtenstein, 1823. João porcaria. SHARP-TAILED STREAMCREEPER.

Família **FORMICARIIDAE:**

- *Hypodaleus guttatus guttatus* Vieillot, 1816. Chocão. SPOT-BACKED ANTSHRIKE.
- *Batara cinerea cinerea* Vieillot, 1819. Borralha. Gigante. GIANT ANTSHRIKE
- *Mackenziaena severa* Lichtenstein, 1823. Borralha. menor. TUFED ANTSHRIKE
- *Tabara major stagurus* Lichtenstein, 1823. Corró. GREAT ANTSHRIKE.
- *Biatas nigropectus* Lafresnaye, 1850. Borralha barra branca. WHITE-BEA-REDED ANTSHRIKE.
- *Thamnophilus punctatus ambiguus* Swainson, 1825 Choca. SLATY ANTSHRIKE
- *Thamnophilus caerulescens caerulescens* Vieillot, 1816. Chóca. VARIABLE ANTSHRIKE.
- *Thamnophilus ruficapillus ruficapillus* Vieillot, 1816. Chóca cabeça .narron. RUFOUS-CAPPED ANTSHRIKE.
- *Dysithamnus stictothorax* Temmonck, 1823. Chóca peito pintado. SPOT-BREAISED ANTIVIREO.
- *Dysithamnus mentalis mentalis* Temminck, 1823. Chóca. PLAIN ANTIVIREO.
- *Thamnomanes caesius caesius* Temminck, 1820. Chóca. cinza CINEREOUS ANTSHRIKE.
- *Thamnomanes plumbeus plumbeus* Cabanis, 1847. Chóca chumbo. PLUMBEUS ANTSHRIKE.
- *Myrmotherula gularis* Spix, 1825. Formigueiro estrelado. STAR-THROATED ANTWREN.
- *Myrmotherula erythronota* Hartlaub. Formigueiro. BLACKHOODED ANT WREN
- *Myrmotherula axillaris luctuosa* Pelzeln, 1868. Formigueiro costas claras. WHITE-FLANKED ANT WREN.
- *Myrmotherula minor* Salvadori, 1867. Formigueiro pequeno. SALVADORIS ANT WREN.
- *Myrmotherula urosticta* Sclater, 1857. Formigueiro cauda rajada. BAND-TAILED ANT WREN.
- *Herpilochmus rufimarginatus rufimarginatus* Temminck, 1822. Formigueiro de aza ruiva. RUFOUS-WINGED ANT WREN.
- *Formicivora grisea deluzae* Ménériés, 1835. Formigueiro franjada de branco. WHITE-FRINGED ANT WREN.
- *Formicivora serrana* Hellmayr, 1929. Formigueiro de serra. SERRA ANT WREN
- *Formicivora melanogaster bahiae* Hellmayr, 1909. Formigueiro ventre negro. BLACK-BELLIED ANT WREN.
- *Drymophila ferruginea* Temminck, 1822. Trovoada. FERRUGINOUS ANT BIRD.
- *Drymophila squamata* Lichtenstein, 1823. Papa-formiga escamado. SCALED ANT BIRD.
- *Terenura maculata* Wied, 1831. Formigueiro cabeça ointada. STREAK-CAPPED ANT WREN.
- *Cercomarca brasiliiana* Hellmayr, 1925. Formigueiro. RIO DE JANEIRO ANT BIRD.
- *Pyriglena atra* Swainson, 1825. Papaformiga preta. WHITE-BACKED FIRE EYE
- *Pyriglena leucoptera* Vieillot, 1818. Papaformigas WHITE-SHOUDERED FIRE-EYE.
- *Myrmeciza ruficauda ruficauda* Wied, 1831. Formigueiro cauda ferruginea. SCALLOPED ANT BIRD.
- *Myrmeciza loricata loricata* Lichtenstein, 1823. Formigueiro. WHITE-BIBBED ANT BIRD.
- *Myrmeciza squamosa* Peizeln, 1868. Papaformiga escamado. SQUAMATE ANT BIRD.
- *Chamaeza campanisona campanisona* Lichtenstein, 1818. Továca. SHORT-TAILED ANT THRUSH.

- *Grallaria varia imperator* Lafresnaye, 1842. Tovacuçu. VARIEGATED ANTPITTA.
- *Fornicarius colma ruficeps* Spix, 1824. Pinto-do-mato. RUFIOUS-CAPPED ANTTHRUSH.

Família **CONOPOPHAGIDAE**:

- *Conopophaga lineata lineata* Wied, 1831. Chupa dente listado. RUFIOUS GNATEATER.
- *Conopophaga melanops melanops* Vieillot, 1818. Chupa-dente enegrescido. BLACK-CHEEKED GNATEATER.

Família **RHINOCRYPTIDAE**:

- *Psilorhamphus guttatus* Ménétrés, 1835. Tapacú murino. MOUSE-COLORES TAPACULO.
- *Scytalopus indigoticus* Wied, 1831. Tapacú peito branco. WHITE-BRESTED TAPACULO.

Família **COTINGIDAE**:

- *Laniisoma elegans elegans* Thunberg, 1823. Cotinga amarela. SHRIKE-LIKE COTINGA.
- *Phibalura flavirostris flavirostris* Vieillot, 1816. Tezourinha. SWALLOW-TAILED COTINGA.
- *Tijuca atra* Férussac, 1829. Cotinga preta e amarela. BLACK-AND-GOLD COTINGA.
- *Capornis cucullatus* Swainson, 1821. Corocochó. HOODED BERRYEATER.
- *Capornis melanocephalus* Wied, 1820. Corocochó cabeça preta. BLACK-HEADED BERRYEATER.
- *Cotinga maculata* Muller, 1776. Crijua. BANDED COTINGA.
- *Xipholena atropurpurea* Wied, 1820. Crijua cor vinho. WHITE-WINGED COTINGA.
- *Ideopleura pipra pipra* Lesson, 1831. Anambé. BUFF-THROATED FUR-PLETUFF.
- *Attila spadiceus uropygiatus* Wied, 1831. Araponguinha. BRIGHT-RUMPED ATTLA.
- *Attila rufus rufus* Vieillot, 1819. Capitão de saíra. GRAY-THROATED ATTLA.
- *Laniocera hypopyrrha hypopyrrha* Vieillot, 1817. Planadeira esverdeada. CINE-REOUS MOURNER.
- *Rhytterna simplex simplex* Lichtenstein, 1823. Planadeira cinza. GRAYSH MOURNER.
- *Lipaugus vociferans vociferans* Wied, 1820. Tropeiro. SCREAMING PIHA.
- *Pachyramphus viridis viridis* Vieillot, 1816. Bico grosso. GREEN-BACKED BECARD.
- *Pachyramphus castaneus castaneus* Jardine e Selby, 1827. Bico grosso castanho. CHESTNUT-CROWNED BECARD.
- *Pachyramphus marginatus marginatus* Lichtenstein, 1823. Bico grosso fronte preta. BLACK-CAPED BECARD.
- *Platyparis rufus rufus* Vieillot, 1816. Caneleiro. CRESTED BECARD.
- *Tityra cayana brasiliensis* Swainson, 1837. Araponguinha. BLACK-TAILED TITYRA.
- *Tityra inquisitor inquisitor* Lichtenstein, 1823. Araponguinha corôa. BLACK-CROWNED TITYRA.
- *Pyroderus scutatus scutatus* Shaw, 1792. Pavó. RED-RUFFED FRUITCROW.
- *Procnias nudicollis* Vieillot, 1817. Araponga. NAKED-THROATED BELLEBIRD.

Família **PIPRIDAE**:

- *Pipra rubrocapilla* Temminck, 1821. Uirapurú. RED-HEADED MANAKIN.
- *Pipra pipra cephalucos* Thunberg, 1822. Uirapurú cabeça branca. WHITE-CROWNED MANAKIN.
- *Chiroxiphia caudata* Shaw e Nodder, 1793. Tangará. SWALLOW-TAILED MANAKIN.
- *Antilophia galeata* Lichtenstein, 1828. Uirapirú grande. HELMETED MANAKIN.



- *Hicura militaris* Shaw e Noder, 1808. Tangarazinho. PIN-TAILED MANAKIN.
- *Manacus manacus gutturosus* Desmarest, 1806. Rendeira. WHITE-BEARED MANAKIN.
- *Machaeropterus regulus regulus* Hahn, 1819. Uirapurú peito amarelo rajado. STRIPED MANAKIN.
- *Neopelma aurifrons aurifrons* Wied, 1831. Fruchá. WIED'S TYRANT-MANAKIN.
- *Schiffornis turdinus turdinus* Wied, 1831. Dançador sabiá. THRUSH-LIKE MANAKIN.

Família TYRANNIDAE:

- *Xolmis velata* Lichtenstein, 1823. Viuvinha. WHITE-RUMPED MONJITA.
- *Colonia colonus colonus* Vieillot, 1818. Viuvinha. LONG-TAILED TYRANT.
- *Gubernetes yetapa* Vieillot, 1818. Tezoura do brejo. STREAMER-TAILED TYRANT.
- *Knipolegus lophotes* Hellmayr, 1927. Maria preta pega moscas. CRESTED BLACK-TYRANT.
- *Knipolegus cyanirostris* Vieillot, 1818. Viuvinha preta. BLUE-BILLED BLACK-TYRANT.
- *Muscipara vetula* Lichtenstein, 1823. Papamoscas-cinza. CHEAR-TAILED GRAY-TYRANT.
- *Fluvicola nengeta nengeta* Linnaeus, 1766. Lavadeira de N. Sra. MASKED WATER-TYRANT.
- *Arundinicola leucocephala* Linnaeus, 1764. Pegamoscas orelha branca. WHITE-HEADED MARSH-TYRANT.
- *Satrapa icterophrys icterophrys* Vieillot, 1818. Suiriri. YELLOW-BROWED TYRANT.
- *Machetornis rixosus rixosus* Vieillot, 1819. Bentevi do gado. CATTLE TYRANT
- *Sirystes sibilator sibilator* Vieillot, 1818. Pegamoscas assoviador. SIRYSTES.
- *Muscivora tyrannus tyrannus* Linnaeus; 1766. Tezoura. FORK-TAILED FLYCATCHER.
- *Tyrannus melancholicus melancholicus* Vieillot, 1819. Siriri. TROPICAL KINGBIRD.
- *Empidonomus varibus rufinus* Spix, 1825. Maria-é-dia. YELLOW-RUFFED FLYCATCHER.
- *Conopias trivirgata trivirgata* Wied, 1831. Bentevi-ilstrado. THREE-STRIPED FLYCATCHER.
- *Megarhynchus pitangua pitangua* Linnaeus, 1766. Bentevi-bico-chato. BOAT-BILLEDER FLYCATCHER.
- *Myiodynastes maculatus maculatus* Muller, 1766. Bentevi preto. STREAKED FLYCATCHER.
- *Myiozetetes cayanensis erythropterus* Lafresnaye, 1853. Bentevizinho. RUSTY-MARGINED FLYCATCHER.
- *Myiozetetes similis pallidiventris* Pinto, 1935. Bentevi pequeno. VERMILION-CROWNED FLYCATCHER.
- *Pitangus sulphuratus maximiliani* Cabanis e Heine, 1859. Bentevi de corôa. GREAT KISKADEE.
- *Pitangus lieter lieter* Lichtenstein, 1823. Bentevizinho amarelo. LESSER KISKADEE.
- *Myarchus ferox ferox* Gmelin, 1789. Maria cavaleira. SHORT-CRESTED FLYCATCHER.
- *Myarchus swainsoni swainsoni* Cabanis e Heine, 1859. Irrê. SWAINSON'S FLYCATCHER.
- *Myarchus tuberculifer tricolor* Pelzelin, 1868. Papa-moscas tricolor. DUSKY-TRICOLOR FLYCATCHER.
- *Myarchus tyrannulus bahlae* Berlepsch e Leverkun, 1890. Maria cavaleira. BROWN-CRESTED FLYCATCHER.
- *Contopus cinereus cinereus* Spix, 1825. Papa-moscas cinza. TROPICAL PEWEE
- *Empidonax euleri euleri* Cabanis, 1868. Papa-mosca ventre amarelo. BULER'S FLYCATCHER.

- *Cnemotriccus fuscatus fuscatus* Wied, 1831. Papa-mosca fusco. FUSCOUS FLYCATCHER.
- *Myobius barbatus mastacalis* Wied, 1821. Papamosca barbudo. SULPHUR-RUMPED FLYCATCHER.
- *Myobius atricaudus ridgwayi* Berlepsch, 1888. Papa-mosca cauda negra. CLACK-TAILED FLYCATCHER.
- *Myophobus fasciatus flamiceps* Temminck, 1822. Papa-mosca escuro. BRAN-COLORED FLYCATCHER.
- *Hirundinea ferruginea ferruginea* Gmelin, 1788. João pires. CLIFF FLY-CATCHER.
- *Onychorhynchus coronatus swainson* Pelzeln, 1858. Papa-mosca leque. ROYAL FLYCATCHER.
- *Platyrinchus mystaceus mystaceus* Vieillot, 1818. Bico chato. WHITE-THROATED SPADEBILL.
- *Tolmomyias sulphurescens sulphurescens* Spix, 1825. Bico chato sufureo. YELLOW-OLIVE FLYCATCHER.
- *Tolmomyias poliocephalus selateri* Hellmayr, 1903. Bico coroa cinza. GRAY-CROWNED FLYCATCHER.
- *Rhynchoicyclus olivaceus olivaceus* Temminck, 1820. Bico chato azeitona. OLIVACEUS FLATBILL.
- *Tordirostrum cinereum coloreum* Ridgway, 1906. Tirri. COMMON-GRAY TODY-FLYCATCHER.
- *Tordirostrum poliocephalum* Wied, 1831. Tirri. cara cinza. GRAY-HEADED TODY FLYCATCHER.
- *Tordirostrum plumbeiceps plumbeiceps* Lafresnaye, 1845. Tirri face ocre. OCHRE-FACED TODY-FLYCATCHER.
- *Euscartmornis orbitatus* Wied, 1831. Bico chato olho redondo. EYE-RINGED TODY-TYRANT.
- *Myiornis auricularis cinereicollis* Wied, 1831. Cigarra bico chato cinza. GRAY-EARED PYGMY-TYRANT.
- *Hemitriccus diops diops* Hemminck, 1822. Bico-chato peito sujo. DRAB-BREASTED PYGMY-TYRANT.
- *Leptotriccus sylviofus Cabanis e Heine*, 1859. Papa-mosca anelado. RAY-RINGED TYRANNULET.
- *Phylloscartes paulistus* Thering e Thering, 1907. Papa-mosca paulista. SÃO PAULO TYRANNULET.
- *Capsiempis flaveola flaveola* Lichtenstein, 1823. Papa-mosca amarelo. YELLOW-TYRANNULET.
- *Pseudocolopteryx sclateri* Custalet, 1892. Doradinho de crista. CRESTED DORADITO.
- *Serpophaga suberistata* Vieillot, 1817. Alegrinho. WHITE-CRESTED TYRANNULET.
- *Elaenia flavogaster flavogaster* Thunberg, 1822. Cucurutado. YELLOW-BELLIED ELAENIA.
- *Elaenia mesoleucæ* Cabanis e Heine, 1859. Cucurutado oliva. OLIVACEOUS ELAENIA.
- *Camptostoma obsoletum obsoletum* Temminck, 1824. Curavaca da baixada. SOUTHERN BEARDLESS TYRANNULET.
- *Xanthomyias virescens virescens* Temminck, 1824. Cucurutado esverdeado. GREENISH TYRANNULET.
- *Acrochordopus burmetsteri* Cabanis e Heine, 1859. Cucurutado. ROUGH-LEGGED TYRANNULET.
- *Leptopogon amaurocephalus amaurocephalus* Tchudi, 1846. Papamosca fronte sépia. SEPIA-CAPPED FLYCATCHER.
- *Pipromorpha oleaginosa oleaginosa* Lichtenstein, 1823. Abre-aza ocre. OCHRE-BELLIED FLYCATCHER.

Família OXYRUNCIDAE:

- *Oxyrucus cristatus cristatus* Swainson, 1821. Bico-aguçado de crista. CHARPBILL.

Família **HIRUNDINIDAE:**

- *Progne subis subis* Linnaeus, 1758. Andorinha purpura. PURPLE MARTIN.
- *Progne chalybea domestica* Vieillot, 1817. Andorinha grande. SOUTHERN MARTIN.
- *Progne tapera fusca* Vieillot, 1817. Andorinha dos Rios. BROWN-CHESTED MARTIN.
- *Stelgidopterys ruficollis ruficollis* Vieillot, 1817. Andorinha aza em serra. ROUGH-WINGED SWALLOW.
- *Neechelidon tibialis tibialis* Cassin, 1853. Andorinha perna branca. WHITE-THIGHED SWALLOW.
- *Notchelidon cyanoleuca cyanoleuca* Vieillot, 1817. Andorinha azul e branca. BLUE-AND-WHITE SWALLOW.
- *Riparia riparia riparia* Linnaeus, 1758. Andorinha parda. BANK SWALLOW.
- *Hirundo rustica erythrogaster* Boddaert, 1783. Andorinha de bando. BARN SWALLOW.

Família **TROGLODYTIDAE:**

- *Campylorhynchus turdinus turdinus* Wied, 1821. Garrinção orelha-branca. WHITE-HEADED WREN.
- *Thryothorus genibarbis genibarbis* Swainson, 1837. Garrinção de bigode. MOUSTACHED WREN.
- *Troglodytes aedon aedon* Vieillot, 1807. Cambaxirra. HOUSE WREN.

Família **MIMIDAE:**

- *Mimus gilvus antelius* Oberholser, 1819. Sabiá da praia. TROPICAL MOCKINGBIRD.
- *Mimus saturninus frater* Hellmayr, 1903. Sabiá poca. CHALK-BROWED MOCKINGBIRD.
- *Donacobius atricapillus atricapillus* Linnaeus, 1766. Pássaro-angú. BLACK-CAPPED MOCKINGTHRUSH.

Família **TURDIDAE:**

- *Turdus albicollis crotopezus* Lichtenstein, 1823. Sabiá coleira. WHITE-NECKED THRUSH.
- *Turdus fumigatus fumigatus* Lichtenstein, 1823. Sabiá verdadeiro. COCOA THRUSH.
- *Turdus amaurochalinus Cabanis*, 1851. Sabiá branco. CREAMY-BELLIED THRUSH.
- *Turdus rufiventris rufiventris* Vieillot, 1818. Sabiá laranja. RUFOUS-BELLIED THRUSH.
- *Attycephala flavipes flavipes* Vieillot, 1818. Sabiá-úna. YELLOW-LEGGED THRUSH.

Família **MOTACILLIDAE:**

- *Anthus lutescens lutescens* Pucheran, 1855. Peruzinho caminheiro. YELLOW-WISH PIPT.

Família **VIREONIDAE:**

- *Cyclarhis gujanensis ochrocephala* Tschudi, 1845. Gente-de-fora-vem. RUFOUS-BROWED PEPPERSHRIKE.
- *Vireo olivaceus chivi* Vieillot, 1817. Juruvinha. RED-EYED VIREO.
- *Myiophilus thoracicus thoracicus* Temminck, 1822. Juruviara. LEMON-CHESTED GREENLET.

Família **ICTERIDAE:**

- *Molothrus bonariensis bonariensis* Gmelin, 1789. Maria-preta. SHINY COWBIRD
- *Icterus cayanensis tibialis* Swainson, 1837. Encontro. EPAULET ORIOLE.
- *Cacicus haemorrhous affinis* Swainson, 1834. Jupira. RED-RUMPED CACIQUE
- *Psarocolius decumanus maculosus* Chapman, 1920. Japú gamela. CRESTED ORODENDOLA.
- *Scaphidura oryzivora oryzivora* Gmelin, 1788. Grumará gigante olho verde. GIANT COWBIRD.

- *Gnorimpsar chopi chopi* Vieillot, 1819. Graúna. **CHOPÍ BLACKBIRD.**
- *Agelaius cyanopus cyanopus* Vieillot, 1819. Pássaro preto pequeno. **UNICOLORS BLACKBIRD.**
- *Agelaius ruficapillus frontalis* Vieillot, 1819. Maria preta peito marron. **CHESTNUT CAPPET BLACKBIRD.**
- *Leistes militaris superciliaris* Bonaparte, 1850. **RED-BREASTED BLACKBIRD.**

Família **PARULIDAE:**

- *Parula pitiayumi pitiayumi* Vieillot, 1817. Mariquita. **TROPICAL PARULA.**
- *Geothlypis aequinoctialis velata* Vieillot, 1817. Mariquita. **MASKED YELLOW-THROAT.**
- *Coereba flaveola chloropyga* Cabanis, 1851. Seblinho. **BANANAQUIT.**
- *Conirostrum bicolor bicolor* Vieillot, 1897. Meleiro bicolor. **BICOLORED COSEBILL.**
- *Cyanerpes cyaneus cyaneus* Linnaeus, 1766. Saira beija-flor. **RED-LEGGED HONEY-CREEPER.**
- *Chlorophanes spiza axillaris* Zimmer, 1929. Saira verde. **GREEN HONEY-CREEPER.**
- *Daenis cayana paraguayensis* Chubb, 1910. Saira azul **BLUE DACNIS.**
- *Daenis nigripes* Pelzeln, 1856. Saira pé preto. **BLACK-LEGGED DACNIS.**

Família **THRAUPIDAE:**

- *Tangara velia cyanomelaena* Wied, 1830. Saira pérola. **OPAL-RUMPED TANAGER.**
- *Tangara seledon* P. L. Muller, 1776. Saira sete cores. **GREEN-HEADED TANAGER.**
- *Tangara cayana flava* Gmelin, 1789. Saira cara suja. **RUFIOUS-CROWNED TANAGER.**
- *Tangara mexicana brasiliensis* Linnaeus, 1766. Saira azul e branca. **TURQUOISE TANAGER.**
- *Chlorophonia cyanea cyanea* Thunberg, 1822. Gaturamo bandeirinha. **BLUE-HODED EUPHONIA.**
- *Euphonia xanthogaster xanthogaster* Sundevall, 1834. Gaturamo. **ORANGE-BELLIED EUPHONIA.**
- *Euphonia violacea auranticollis* Bertoni, 1901. Gaturamo verdadeiro. **VIOLACEOUS EUPHONIA.**
- *Euphonia musica aureata* Vieillot, 1822. Gaturamo rei, cabeça azul. **BLUE-HODED EUPHONIA.**
- *Thraupis sayaca sayaca* Linnaeus, 1766. Sanhaço do mamão. **SAYACA TANAGER.**
- *Thraupis cyanoptera* Vieillot, 1817. Sanhaço bico grosso. **AZURE-SHOULDERSD TANAGER.**
- *Thraupis ornata* Sparrman, 1789. Sanhaço de encontro. **GOLDEN-CHECRO-NED TANAGER.**
- *Thraupis palmarum palmarum* Wied, 1821. Sanhaço coqueiro. **PAIM-TANAGER.**
- *Ramphocelus bresilius dorsalis* Sciator, 1855. Tiê-sangue. **BRAZILIAN TANAGER.**
- *Piranga flava saira* Spix, 1825. Sangue de boi. **HEPATIC TANAGER.**
- *Habia rubica rubica* Vieillot, 1817. Tiê da mata. **RED-CROWNED ANT-TANAGER.**
- *Tachyphonus coronatus* Vieillot, 1822. Tiê preto. **RUBY-CROWNED TANAGER**
- *Trichothraupis melanops* Vieillot, 1818. Tiê de topete. Saira cabeça marron e amarela. **RUFIOUS THROATED TANAGER.**
- *Thlypopsis sordida sordida* Lafresnaye e d'Orbigny, 1837. Saira canário. **ORANGE-HEADED TANAGER.**
- *Cissops leveriana major* Cabanis, 1851. Pintasilva da mata. **MAGPIE TANAGER**
- *Schistochlamys melanops olivina* Lathan, 1790. Bico de veludo face negra. **BLACK-FACED TANAGER.**
- *Tachyphonus cristatus brunneus* Spix, 1825. Tiê galo. **FLAME-CRESTED TANAGER.**

Familia **FRINGILIDAE:**

- *Saltator maximus maximus* P. L. S. Muller, 1776. Trinca-ferro. BUFF-THROATED SALTATOR.
- *Corythoastes canadensis brasiliensis* Cabanis, 1851. Canário do mato. BLACK-FACED GROSBEAK.
- *Ptylus fuliginosus* Daudin, 1800. Bico pimenta. BLACK-THROATED GROSBEAK.
- *Cyanocompsa cyanea sterea* Oberrholser, 1901. Azulão. ULTRAMARINE GROSBEAK.
- *Tiaris fuliginosa fuliginosa* Wied, 1831. Cigarra preta. SOOTY CRASSQUIT.
- *Sporophila frontalis* Verreaux, 1869. Catatáu. Pichóchó. BUFFY-FRONTED SEEDEATER.
- *Sporophila fascirostris* Temminck, 1820. Papa-capim. TEMMINCK'S SEEDEATER
- *Sporophila collaris collaris* Boddaert, 1783. Coleira do brejo. RUSTY-COLLARED SEEDEATER.
- *Sporophila caerulescens caerulescens* Vieillot, 1817. Colerinha dupla. DOUBLE-COLLARED SEEDEATER.
- *Sporophila nigricollis nigricollis* Linnaeus, 1758. Coleirinho macaco. YELLOW-BELLIED SEEDEATER.
- *Sporophila bouvreuil bouvreuil* Muller, 1776. Caboclinho. CAPPED SEEDEATER
- *Sporophila albogularis* Spix, 1825. Coleira garganta branca. WHITE-THROATED SEEDEATER.
- *Oryzoborus crassirostris maximiliani* Cabanos, 1851. Bicudo. LARGE-BILLED SEED-FINCH.
- *Oryzoborus angolensis angolensis* Linnaeus, 1766. Curio. LESSER SEED-FINCH
- *Sicalis flaveola brasiliensis* Gmelin, 1789. Canário da terra. SAFFRON FINCH
- *Volatina jacarina jacarina* Linnaeus, 1766. Tisú. BLUE-BLACK-CRASSQUIT
- *Coryphospingus pileatus pileatus* Wied, 1821. Tico-tico rei cinza. PILEATED FINCH.
- *Arremon taciturnus taciturnus* Hermann, 1783. Tico-tico da mata.
- *Zonotrichia capensis subtorquata* Swainson, 1783. Tico-tico.
- *Emberizoides herbicola herbicola* Vieillot, 1817. Canário do campo. WEDGEW-TAILED GRASS-FINCH.

**RÉPTEIS:**

Familia **TESTUDINIDAE:**

- *Testuda tabulata* Linnaeus, 1758. Jaboti da mata.

Familia **ALLIGATORIDAE:**

- *Caiman latirostris* Daudin, 1802. Jacaré.

Familia **GEKKONIDAE:**

- *Hemidactylus mabouia* Jonnés, 1818. Borda.

Familia **IGUANIDAE:**

- *Anolis pseudotigrinus* Amaral, 1932. Papa-vento.
- *Anolis transfasciatus* Amaral, 1932. Papa-vento.
- *Noreps marmorata* Amaari, 1932. Lagartixa das árvores.
- *Tropidurus torquatus torquatus* Wied, 1820. Lagartixa dos barracos.

Familia **ANGLIDAE:**

- *Diplogossus fasciatus* Wiegmann, 1834. Lagarto rajado.
- *Ophiodes striatus striatus* Spix, 1825. Lagarto zebrado.

Familia **TEIIDAE:**

- *Anotosaura collaris* Amaral, 1932. Calango.
- *Colobosaura mentalis* Amaral, 1932. Calango.
- *Heterodactylus imbricatus* Spix, 1825. Calango.
- *Ameiva ameiva ameiva* Linnaeus, 1758. Pinima.
- *Tupinambis teguixin* Linnaeus, 1758. Teiú.

## Família AMPHISBAENIDAE:

- *Amphisbaena alba* Linnaeus, 1758. Cobra cega.

## Família SCINCIDAE:

- *Mabuya mabuya mabuya* Lacepède, 1788. Lagarto.

## Família GLAUCONIDAE:

- *Glauconia macrolepis* Peters, 1857.

## Família LEPTOTYPHLOPIDAE:

- *Leptotylops saigueiroi* Amaar, 1954.

## Família TYPHLOPIDAE:

- *Helminthophis guentheri* Boulenger, 1886.

## Família BOIDAE:

- *Boa constrictor constrictor* L. 1758. Gibóia.

## Família COLUBRIDAE:

- *Helicops carinicauda* Wied, 1825.
- *Helicops leopardina* Schlegel, 1837.
- *Mastigodryas bifossatus bifossatus* Raddi, 1820. Jaracuçu do brejo.
- *Mastigodryas boddaertii boddaertii* Sentzen, 1796. Bird listada.
- *Dendrophidion dendrophis* Schlegel, 1837. Caçadora.
- *Spilotes pullatus pullatus* L. 1758. Caninana.
- *Drymarchon corais corais* Boié, 1827. Papa-pinto.
- *Chironius carinatus* L. 1758. Acuti.
- *Chironius fuscus* L. 1758. Arabóia.
- *Leptophis ahaetulla hocercus* Wied, 1825. Azulão-bóia.
- *Leimadophis melanostigma* Wagler, 1824. Jaraquinha do campo.
- *Leimadophis poecilogyrus poecilogyrus* Wied, 1825. Cobra de lixo.
- *Leimadophis viridis* Gunther, 1862. Cobra verde.
- *Liophis affinis* Gunther, 1858. Core-campo.
- *Liophis miliaris miliaris* L. 1758. Tairabóia.
- *Liophis obtusus* Cope, 1863. Tara bóia de lista.
- *Atractus guentheri* Wucherer, 1861.
- *Atractus reticulatus reticulatus* Boulenger, 1885. Cobra vermelha.
- *Sibynomorphus turgidus* Cope, 1868.
- *Dipsas albifrons* Sauvage, 1884. Come-lesma.
- *Xenodon merremii* Wagler, 1824. Boi-péba.
- *Leptodeira annulata annulata* L. 1758. Cacaual.
- *Pseudoboa cloelia* Daudin, 1803. Moçurana.
- *Pseudoboa petola* L. 1758. Boicorá-três-cores.
- *Pseudoboa rhombifera* Dum. Birr. e Dum. 1854. Cobra coral falsa.
- *Pseudoboa trigemina* Dum. Birr. e Dum. 1854. Coral-falsa.
- *Pseudoboa newellii* Dum Birr. e Dum. 1858. Cobra-de-sangue.
- *Dryophylax pallidus strigatus* Gunther, 1858. Ubiracoá.
- *Philodryas pseudoserra* Amaral, 1937.
- *Oxybelis aeneus* Wagler, 1824. Cobra cipó bicuda.
- *Erytrolamprus aesculapii* L. 1758. Boicorá. Falsa coral.
- *Elapomorphus blumii* Schlegel, 1837. Cobra pescoço-branco.
- *Elapomorphus lepidus* Reinhardt, 1860. Cobra-vermelha-pescoço-preto.

## Família ELAPIDAE:

- *Micrurus decoratus* Jan, 1758. Coral-verdadeira.

## Família CROTALIDAE:

- *Lachesis muta* L. 1766. Surucucú pico-de-jaca.
- *Bothrops alternata* Dum. Birr. e Dum. 1854. Urutú.
- *Bothrops atrox* L. 1758. Jararaca.
- *Bothrops bilineata* Wied, 1825. Patióba.

- *Bothrops jararaca* Wied, 1824. Preguiçosa.
- *Bothrops jararacussu* Lacerda, 1884. Surucucú-tapete. Jaracussú.
- *Bothrops newiedii* Amaral, 1932. Jaraca vermelha.

**ANFÍBIOS:****Família CAECILIIDAE:**

- *Caecilia annulata* Mikan, 1820. Cobra cega.
- *Siphonops hardyi* Boul., 1888. Cobra cega.

**Família BUFONIDAE:**

- *Bufo crucifer* Wied, 1821. Sapo dos jardins.
- *Bufo arenarum* Hensel, 1867. Sapo da mata.

**Família CEROTOPHEYDAE:**

- *Ceratophrys dorsata* Wied, 1824. Sapo intanha. Sapo Boi.
- *Stombus boiei* Wied, 1825. Sapo de chifre.

**Família LEPTODACTYLIDAE:**

- *Leptodactylus ocellatus* L. 1758. Rã.
- *Leptodactylus pentadactylus* Laur. 1768. Rã pimenta.
- *Leptodactylus mystaceus* Spix, 1824. Rãzinha pintada.
- *Physalaemus aguirrei* Bokermann, 1966.
- *Elosia vomerina* Gir., 1853.
- *Thorepa miliaris* Spix, 1824.
- *Pseudis paradoxa* Garmann, 1883.
- *Rhinoderma signifera* Girard, 1853.
- *Eleutherodactylus binotatus* Spix, 1824.
- *Macrogeniogliottus alipici* Carvalho, 1946. Sapo andante.

**Família HYLIDAE:**

- *Hyla bivittata* Boul. 1888. Pereréca.
- *Hyla bipunctata* Spix, 1824. Pereréca.
- *Hyla leucophyllata* Beirís., 1873. Pereréca.
- *Hyla elegans* Wied, 1824. Pereréca.
- *Hyla microps* Peters, 1872. Pereréca.
- *Hyla geográfica* Spix, 1824. Pereréca.
- *Hyla faber* Wied, 1821. Pereréca grande. Ferreiro.
- *Trachycephalus nigromaculatus* Tschudi, 1838.
- *Sphaenorhynchus lacteus* Daudin, 1803. Pereréquinha.
- *Phyllomedusa burmeisteri* Boul. 1882. Pereréca.

**Família BRACHYCEPHALIDAE:**

- *Brachycephalus ephippium* Spix, 1824.

**Família DENDROBATIDAE:**

- *Phyllobates capixaba* Bokermann, 1967.

**Família MICROHYLIDAE:**

- *Stereocyclops incrassatus* Cope, 1870.
- *Microhyla microps* Dum. e Birb., 1841.

**PEIXES:****Família TETRAGONOPTERIDAE:**

- *Astyanax brevirohinus* Eigenm., 1908. Acará.
- *Astyanax bimaculatus vittatus* Castelnau, 1855. Piaba.
- *Hemichilus wheatlandii* Garman, 1890. Piabinha.
- *Cheirodon parahybae* Eigenm., 1915. Piaba.
- *Prochilodus vimboides* Knr., 1859. Curimatá.
- *Leporinus crassilabris* Borodin, 1929. Piáu.
- *Brycon devillei* Castelnau, 1855. Piabanha.
- *Hoplias malabaricus* Bloch. 1648. Traíra.

Algumas espécies da Família LORICARIIDAE. Os cascudos.

Algumas espécies da Família PIMELODIDAE. Os jundiás, Bagres e Bagrinhos.

Estes entre os principais.

## BIBLIOGRAFIA

- AGUIRE, Alvaro — 1951 — Soóretama. Estudo sobre o Parque de Reserva. Refúgio e Criação de Animais Silvestres, "Soóretama", no Município de Linhares. E. E. Santo. SIA. do Min. Agric. p. 1-50
- RUSCHI, Augusto — 1979 — AVES DO BRASIL, pp. 1-325. Editora Rios. S. Paulo.
- RUSCHI, Augusto — 1949 — As Reservas Florestais e Biológicas do E. Santo e a Proteção a Natureza. Atos Oficiais da sua criação. Bol. Mus. Biol. M. Leitão. Sér. Prot. Natureza. n.º 1A — 26-6-49. pp. 1-4.
- RUSCHI, Augusto — 1954 — Algumas espécies zoológicas e botânicas em vias de extinção no E. E. Santo. Método empregado para a sua prospecção e para o estabelecimento de área mínima para a perpetuação da espécie em seu habitat natural. Bol. M.B.M.L. Sér. Prot. Nat. n.º 16A p. 1-45.
- RUSCHI, Augusto — 1950 — Fitogeografia do E. Santo. B.M.B.M.L. Sér. Botânica. n.º 1. p. 1-353.
- RUSCHI, Augusto — 1967 — Lista dos Anfíbios do E. E. Santo. Bol. M.B.M.L. Sér. Zool. n.º 27A p. 1-6.
- RUSCHI, Augusto — 1965 — Lista dos Peixes, Tubarões, Ralas, de água doce e salgada, do E. E. Santo e a introdução do dourado no Rio Doce. Bol. M.B.M.L. Sér. Zool. n.º 25A. p. 1-24.
- RUSCHI, Augusto — 1965 — Lista dos Mamíferos do E. E. Santo. Bol. M.B.M.L. Sér. Zool. n.º 24A. p. 1-40.
- RUSCHI, Augusto — 1966 — Lista dos Répteis do E. E. Santo. Bol. M.B.M.L. Sér. Zool. n.º 26A. p. 1-6.
- RUSCHI, Augusto — 1979 — OBJETIVOS E DESTINO DAS RESERVAS BIOLÓGICAS DO BRASIL. Bol. M.B.M.L. N.º do Aniv. do Museu. pg. 153-183.